



GEORG ARENDS





Versäumen Sie nicht, unsere Gärtnerei zu besichtigen, wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte. Ihr Besuch ist uns jederzeit willkommen und wir sind sicher, daß Sie hier manches Interessante und Neue finden werden.

Gartenpflanzen SB

Selbstbedienung + Beratung

April – Mai und Mitte Sept. – Oktober

Georg Arends

56 Wuppertal 21 / Ronsdorf

Monschastr. 76 Telefon 46 46 10

Aus personellen Gründen ist eine individuelle Beratung in der Verkaufssaison nur Samstag vormittags möglich.

Geschäfts-zeit: Montag–Freitag 8–12 Uhr 13–17 Uhr
Samstag 8–12 Uhr

Die Ausarbeitung von Bepflanzungs-Plänen ist nicht möglich. Die Durchführung von Pflanzarbeiten kann von uns nicht übernommen werden, da wir darauf nicht eingestellt sind. Wir weisen Ihnen auf Wunsch aber zuverlässige Gartenarchitekten und Gartengestalter nach, soweit uns solche in Ihrer Gegend bekannt sind.

Umschlagbild: Rhododendron (Aronense)® (G. A.)
„Geisha Hybride“

GEORG ARENDS

Staudenkulturen · Winterharte Gartenpflanzen

56 WUPPERTAL 21/RONSDORF

Monschastr. 76 · Postfach 21 01 07 · Ruf Nr. (02121) 46 46 10
ab 1. 6. 1975 (02 02) 46 46 10

Postscheckamt Köln BLZ 37010050 Konto-Nr. 9141-504

Deutsche Bank Wuppertal-21 BLZ 330 700 90 Konto-Nr. 071/0053

Stadtsparkasse Wuppertal-21 BLZ 330 500 00 Konto-Nr. 400 176

1888



1975

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

(Ausgabe 1975)

	Seite
Wegweiser zur Firma G. Arends	2. Umschlagseite
Staudensortimente	5
Zeichenerklärungen	5
Schmuck- und Schnittstauden	6
Niedrige Stauden für Steingarten, Trockenmauer und Bodenbegrünung	40
Winterharte Ziergräser	66
Freilandfarne	68
Sumpf- und Wasserpflanzen	70
Seerosen (Nymphaea)	74
Schling- und Kletterpflanzen	76
Rhododendron Arendsii-Hybriden (G.A.)	76
Rhododendron (Aronense)® Geisha-Hybriden (G.A.)	78
Rhododendron	78
Heidekräuter, Moorbeetpflanzen/Kleingehölze	80
Empfehlenswerte Stauden zur besonderen Verwendung	84
Wertvolle Staudenbücher	86
Verzeichnis der Gattungsnamen	87
Deutsche Pflanzennamen	89
Lieferbedingungen	3. Umschlagseite

Preise auf der Klappe des Umschlages

87 JAHRE

sind es her, daß die Staudengärtnerei GEORG ARENDS im Frühjahr 1888 in Ronsdorf bei Wuppertal gegründet wurde. In rauher, niederschlagsreicher Höhenlage des „Bergischen Landes“ wurden seitdem Millionen winterharte Staudenpflanzen herangezogen und in alle Welt verschickt.

In allen diesen Jahren wurden hier mehrere hundert Staudensorten und -arten sowie Rhododendron gezüchtet oder züchterisch verbessert. Bei Anbauvergleichen im In- und Ausland bewähren sich unsere abgehärteten und widerstandsfähigen Neuheiten immer wieder und werden häufig mit Wertzeugnissen ausgezeichnet. Auch auf Pflanzenausstellungen (erstmalig 1890 in Mainz) im In- und Ausland zeigten wir regelmäßig unsere Staudenpflanzen und Rhododendron, die mit hohen und höchsten Auszeichnungen anerkannt wurden.

Unser Sortiment in winterharten Staudenpflanzen und Rhododendron ist auch heute noch sehr umfangreich und durch viele Jahre erprobt. Neben unseren eigenen Pflanzenzüchtungen werden natürlich auch bewährte Neuzüchtungen oder Neueinführungen des In- und Auslandes in unser Sortiment aufgenommen und angeboten.

Größten Wert legen wir darauf, wirklich nur das Beste anzubieten. Unsere nun 87jährige betriebseigene Erfahrung in Pflanzenzucht und Pflanzenversand kommt dem Pflanzenverwender zugute. Die fachgerechte Auswahl und Beratung, in Verbindung mit der Auslieferung von nur einwandfreien Pflanzen wird uns immer wieder bestätigt.

Als **Mitglied** der „**Sondergruppe Stauden**“ im Zentralverband Gartenbau und der **Internationalen Staudenunion (ISU)** unterziehen wir uns regelmäßigen Überprüfungen unserer Pflanzenbestände auf Sortenechtheit, Gesundheit und Qualität. Dadurch sind wir berechtigt, das **Gütezeichen „Deutsche Qualitätsstauden“** zu führen. Darüber hinaus gibt Ihnen unser eigenes **Firmenzeichen**, das unseren Namen mit der pflegenden Hand des Gärtners und dem botanischen Zeichen für die Staude verbindet, Gewähr für bestmögliche Leistungen.

Staudenkauf ist Vertrauenssache!

Weiterhin werden wir bestrebt sein, das Vertrauen unserer Kunden zu erhalten und es weiter zu festigen. Möge die Zukunft Ihnen ungetrübte Freude an Ihrem Garten und seinen Pflanzen bringen und uns die Möglichkeit geben, unsere Verbindung weiterhin zu pflegen.



Qualitätszeichen
Stauden

Winterharte Gartenstauden

sind Blüten- und Blattgewächse, die alljährlich im Frühjahr aus einem ausdauernden Wurzelstock ihre krautartigen Triebe entfalten, um dann im Verlauf des Gartenjahres mit ihren Blüten und Fruchtständen oder bodendeckendem Grün zu erfreuen. Mit Ausnahme einer Gruppe von **wintergrünen** Gartenstauden ziehen sie sich im späten Herbst zur Winterruhe zurück.

Schon Ende Februar, Anfang März eröffnen einige unserer Gartenstauden den farbenfrohen Blütenreigen, der sich bis zum späten Herbst erstreckt und somit unsere Gärten dauernd und abwechslungsreich belebt.

Die **Verwendungsmöglichkeit** der winterharten Gartenstauden sind recht umfangreich, sie reichen von Standorten in voller Sonne bis hin zur tiefsten Schattenecke. Entsprechende Hinweise auf Blütenfarbe, Blütezeit, Pflanzhöhe, Standort und Pflanzennachbarn finden Sie in unserer Pflanzenliste bei jeder Sorte und Art angeführt.

Verwenden Sie Stauden als:

Beet- und Schnittstauden

Solitärpflanzen

Sonnen- oder Schattenbepflanzung

Bodendecker

Grabbeepflanzung

Heidegarten

Steingarten

Mauer- und Treppenfugenbepflanzung

Dach-Gärten, Atrium-Gärten

Trog-, Kübel- oder Balkonkastenbepflanzung

Moorbeet-, Sumpf-, Wasser- oder Kiesbeetbepflanzung
ausgefallene Vasendekorationen

Vor der Pflanzung sind die vorgesehenen Pflanzstellen gründlich (25 – 30 cm) aufzulockern, um sie dann mit Humusstoffen, wie feuchtem Torf und Kompost anzureichern. Als Vorratsdüngung können Hornspäne und Knochenmehl (150 g Hornspäne und 50 g Knochenmehl pro Quadratmeter) untergehackt werden

Der Pflanzenbedarf für einen Quadratmeter beträgt:

Starkwachsende Schmuck- und Schnittstauden (Achillea, Astilben, Chrysanthemum, Delphinium, Lupinus, Monarda u. a.): 3 – 5 Stück

Mittelstarkwachsende Schmuck- und Schnittstauden (Aster amellus, Doronicum, Erigeron, Phlox, Rudbeckia): 5 – 8 Stück

Schwachwachsende Schmuck- und Schnittstauden (Aquilegia, Gaillardia, Geum, Heuchera, Liatris, Lychnis, Primula u. a.): 10 Stück


Starkwachsende Polsterstauden (Alyssum, Gypsophila Rosenschleier, Oenothera missouriensis, Polygonum affine, u. a.): 8 – 12 Stück

Alle übrigen Polsterstauden (Armeria, Aubrieta, Campanula, Iberis, Phlox subulata, Saxifraga, Veronica u. a.): 12 – 20 Stück.

Die sorgfältige Pflanzung der Stauden ist für ihr weiteres Gedeihen von größter Bedeutung. Selbstverständlich sollte es sein, daß die Größe der Pflanzlöcher dem Wurzelumfang der Stauden entspricht, d. h. daß die Wurzeln senkrecht in den Boden kommen und sich leicht nach allen Seiten ausdehnen können. An den Pflanzen ist es jeweils leicht ersichtlich, wie tief dieselben im Anzuchtbeet gepflanzt waren, d. h. es ist äußerst wichtig, Stauden und Gehölze am neuen Standort genau so tief zu pflanzen. Ein zu hohes oder zu tiefes Pflanzen schmälert den Erfolg. Ein festes Andrücken der Wurzeln nach der Pflanzung und das Angießen der Pflanzen sind ebenfalls von großer Bedeutung für das gute Anwachsen der Pflanzen.

Die weitere Pflege der Stauden beschränkt sich lediglich auf eine gelegentliche Lockerung des Bodens. Eine Düngung sollte erst nach völligem Anwachsen im folgenden Frühjahr nach dem Austrieb erfolgen, und zwar mit handelsüblichem Volldünger, wobei eine Gabe von 40 – 50 g pro Quadratmeter genügen dürfte.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung im **Pflanzenversand** macht es uns möglich, auch über größte Entfernungen hinweg, Gartenpflanzen zu versenden. Zahlreiche Anerkennungen bestätigen uns dies immer wieder.



Yucca filamentosa, Palmilie

Die Preise zu den angegebenen **Preisgruppen** können Sie in der Tabelle auf der Klappe des Umschlages ersehen.

Sämtliche Abbildungen in diesem Katalog sind Originalaufnahmen aus unserem Betrieb. Der Nachdruck der Bilder und des Katalogtextes, auch auszugsweise, ist verboten.

Staudenzusammenstellung

nach unserer Wahl

Sollten Sie uns die Auswahl der Pflanzen für Ihre 'Grüne Stube' überlassen so stehen Ihnen folgende Sortimente zur Verfügung:

- I. 100 Stück Bodendecker für sonnige Lage in 10 Sorten unserer Wahl
- II. 100 Stück Bodendecker für halbschattige bis schattige Lage in 10 Sorten unserer Wahl
- III. 100 Stück niedrige Stauden für Steingarten und Trockenmauer in sonniger Lage mit 20 guten Sorten unserer Wahl
- IV. 100 Stück niedrige Stauden für Steingarten und Trockenmauer in halbschattiger bis schattiger Lage mit 20 guten Sorten nach unserer Wahl
- V. 100 Stück niedrige Stauden für Steingarten und Trockenmauer in sonniger Lage mit 30 erlesenen Sorten, unter Zugabe von Seltenheiten
- VI. 100 Stück niedrige Stauden für Steingarten und Trockenmauer in halbschattiger bis schattiger Lage mit 30 erlesenen Sorten, unter Zugabe von Seltenheiten
- VII. 100 Stück Schnittstauden für sonnige Lage in 20 erprobten Sorten unserer Wahl
- VIII. 100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für sonnige Lage in 20 guten Sorten unserer Wahl
- IX. 100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für halbschattige bis schattige Lage in 20 guten Sorten unserer Wahl
- X. 100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für sonnige Lage in 30 erlesenen Sorten unserer Wahl
- XI. 100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für halbschattige Lage in 30 erlesenen Sorten unserer Wahl
- XII. 100 Stück Heidepflanzen in 20 guten Sorten unserer Wahl

Sollten Sie sich für eine unserer Staudenzusammenstellungen entscheiden, so lassen Sie uns dann bitte die Nummer des entsprechenden Sortimentes wissen.

In unseren Sortimenten verstecken sich keine 'Ladenhüter', es handelt sich um gute Sorten in bester Qualität, in einwandfreier Etikettierung.

Es ist natürlich auch möglich, halbe Sortimente zum jeweils halben Sortimentspreis zu bestellen.

Zeichenerklärung

- N = Nachbarn: d. h. Pflanzen, die durch ihre Blüten- und Blattfärbung, sowie durch ihr Wachstum Nachbarn sein können.
- ✕ = Schnittblume: d. h. Pflanzen, deren Blüten einen erprobten Wert als Schnittblumen haben.
- = volle Sonne: d. h. Pflanzen, die Sie an vollsonnigem Standort ansiedeln können.
- ◐ = Halbschatten: d. h. Pflanzen, die an etwas absonnigen, halbschattigen Plätzen gut gedeihen.
- ◑ = Schatten: d. h. Pflanzen, die auch noch im tiefen Schatten durch ihr Grünen und Blühen erfreuen.
- B = Blatt: d. h. eine kurze Beschreibung der oft interessanten Belaubung unserer Stauden.
- Bl = Blüte: d. h. eine Beschreibung der Blüten.
- (G. A.) = Georg Arends: d. h. Pflanzen, die in unserem Betrieb gezüchtet wurden.
- T = Topf: d. h. Pflanzen, die in Tontöpfen oder Container herangezogen werden und mit ihren Topfballen auch während der Sommermonate bedenkenlos gepflanzt werden können. Wir behalten uns vor, insbesondere bei Schnitt- und Schmuckstauden ggf. qualitätsbedingt auch Freilandpflanzen zu liefern.
- ® = Warenzeichen, eingetragen für Georg Arends, Wuppertal
Nachbau verboten!

Beim Planen und Pflanzen von Staudenbeeten ist auf die erreichbare Endhöhe der Pflanzen zu achten; diese ist jeweils in Zentimetern angegeben.

Ebenfalls ist die Kenntnis der Blütezeit von großer Bedeutung; Sie finden die entsprechenden Blütemonate bei jeder Pflanzenbeschreibung aufgeführt.

Die Preise, angegeben in 'Deutscher Mark', sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Kulturdauer und -schwierigkeit gestellt.

Schmuck- und Schnittstauden

Achillea – Schafgarbe – Compositae – ○ ✕

Anspruchslose, in jedem Gartenboden gedeihende Staude mit gefiederten Blättern und doldigen Blütenständen.

N.: Delphinium, Lychnis chalcidonica, Chrysanthemum max.

filipendula 'Coronation Gold', B graugrün, Bl goldgelb, 80–100 cm, Juli/August T 4

– **'Parkers Varietät'**, Bl goldgelb, 100–120 cm, Juli/August T 3

millefolium 'Cerise Queen', B fiederschnittig, Bl kirschrot, 40–50 cm, Juni/August T 4

ptarmica 'Schneeball', Bl weiß gefüllt, 60–70 cm, Juli/August T 4

Aconitum – Eisenhut – Ranunculaceae – ○ ◐ ✕

Eine stattliche, in kühlen und feuchten Humusböden gedeihende Staude mit tief zerteilten Blättern und endständigen, blauen oder gelben Blütenrispen.

N.: Astilben, Cimicifuga, Etagen- und Glockenprimeln.

xarendsii hort. (G.A.), B glänzend grün, Bl dunkelblau straffstielig, 100–120 cm, September/Okttober T 5

napellus 'Sparks Var.', B fiederartig geschlitzt, Bl tiefviolett, 120–150 cm, Juli/August T 4

paniculatum 'Nanum' (G.A.), Bl blauviolett, 80–100 cm, Juli/August T 4

Actaea – Christophskraut –

Ranunculaceae – ◐ ◑ Empfehlenswerte Schattenstaude, die durch ihren Beerenschmuck besonders gefällt.

N.: Gentiana asclepiadea, Helleborus, Mertensia, Patrinia.

alba, B gefiedert, Bl weiß, 60–80 cm, Mai/Juni, weiße Früchte an roten Stielen T 7

spicata, B gefiedert, Bl weiß, 40–50 cm, Mai/Juni, schwarze Früchte T 7

– **Rubra**, B gefiedert, Bl weiß, 40–50 cm, Mai/Juni, rote Früchte T 7

Alchemilla – Frauenmantel – Rosaceae – ◐ ◑

Anspruchslose, eigentlich zu selten verwendete Wildstaude für halb- bis schattigen Standort.

N.: Bergenia, Brunnera, Campanula

mollis, B besonders wirkungsvoll im Morgentau, Bl gelb, 20–30 cm, Juni/Juli T 2

Althaea – Stockrose – Malvaceae – ○ ✕

Altbekannte, sehr wirkungsvolle Schnitt- und Schmuckstaude für sonnigen Standort und nährhaften Boden.

N.: Achillea, Delphinium, Salvia.

ficifolia, B gelappt, Bl rosa und rote Töne, einfach, 180–200 cm, Juli/September T 2

– **Pleniflora**, Bl gefüllt, rot, rosa, gelb, weiß, nach Farben getrennt T 2

Anemone – Herbstanemone –

Ranunculaceae – ○ ◐

Dankbarer Herbstblüher für halbschattigen, geschützten Standort und feucht-humosen Boden.


N.: Aconitum, Farne, Tiarella, in Azaleenpflanzungen.

japonica 'Septembercharme', Bl rosa, großblumig, einfach, 60–80 cm, August/September T 5

– **'Honorine Jobert'**, Bl weiß, einfach, 60–80 cm, September/Okttober T 5


– **'Königin Charlotte'**, Bl altrosa, halbgefüllt, 60–80 cm, September/Okttober T 5

vitifolia 'Robustissima', Bl rosa, einfach, starkwachsend, 80–100 cm, August/September T 5



Aconitum arendsii (G. A.), Eisenhut
Anemone japonica (G. A.), Herbstanemone
Aquilegia caerulea, Akelei

	Preisgruppe
Aquilegia – Akelei – Ranunculaceae – ○ ● ✂ Eine bekannte, in nährhaftem Gartenboden und lichtem Schatten gedeihende Gartenstaude mit zierlichem Laub und meist gespornten Blüten in allen Farben. N.: <i>Dicentra spectabilis</i> , <i>Digitalis</i> , <i>Polemonium</i> . caerulea 'Dunkelblaue Riesen', Bl blau, frühblühend, 60–70 cm, Mai T 2 chrysantha , Bl goldgelb, langgespornt, 60–70 cm, Mai/Juni T 2 Hybride 'Crimson Star', rot mit weißer Mitte, 50–60 cm, Juni T 2 – 'Mac Kana Hybrids', Bl großblumige bunte Mischung, langgespornt, 50–60 cm, Juni . . . T 2	
Aruncus – Geißbart – Rosaceae – ○ ● ● Ausgesprochen anspruchslose Solitärstaude, die in sonnigen wie auch schattigen Lagen bestens gedeiht. N.: <i>Chelone obliqua</i> , <i>Geranium</i> , <i>Hosta</i> , <i>Macleaya</i> . sylvester , Bl weiß, 120–150 cm, Mai/Juni . . . T 5	
Aster – Aster – Compositae – ○ ✂	
Berg- oder Sommerastern: Langblühende Beetstaude für sonnige Lagen. Kalkliebend. N.: <i>Coreopsis</i> , <i>Silberdisteln</i> , <i>Rudbeckia</i> , <i>Gräser</i> . amellus 'Lady Hindlip', Bl purpurrosa großblumig, 60–70 cm, September T 5 – 'Rudolf Goethe', Bl lavendelblau, großblumig, 60–70 cm, Sept. T 5 – 'Sternkugel', Bl blau, gute Gruppensorte, 40 cm, September/Okttober 5 – 'Veilchenkönigin', Bl dunkelblau, reichblühend, 40 cm, September T 5 linosyris , B nadelförmig, Bl goldgelb, dichte Dolden bildend, 60 cm, August/September. Wertvolle Wildstaude T 4	
Zwergherbastern: Genügsame, wirkungsvolle Stauden, für Heide-, Steingärten und Gruppenpflanzungen. N.: <i>Calluna</i> , <i>Erica</i> , <i>Gaillardia</i> , <i>Liatris spicata</i> . dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof', Bl leuchtend rosa, bestbewährte Sorte, 30–40 cm, Sept./Okt. T 4 – 'Kassel', Bl intensiv karminrot, mittelgroß, halbgefüllt, Wuchs kugelig, 40 cm, Sept. . . . T 4 – 'Mittelmeer', Bl reinblau, halbgefüllt, 30 cm, Sept. T 4 – 'Prof. A. Kippenberg', Bl strahlend lavendelblau, 40 cm, September/Okttober. Wertzeugnis der Deutschen Gartenbaugesellschaft T 4 – 'Nesthäkchen', Bl dunkelrosa, 25 cm, Sept./Okt. T 4 – 'Schneekissen', Bl reinweiß, 30 cm, Sept./Okt. . T 4 – 'Starlight', Bl rot, reichblühend, etwas höher werdend, 40 cm, September/Oktober T 4	
Rauhblattastern: Eine aufrecht wachsende, genügsame Herbstaster, die noch an halbschattigen Standorten gedeiht. N.: <i>Chrysanthemum hort.</i> , <i>Helenium</i> , <i>Solidago</i> . novae-angliae 'Andenken an P. Gerber', Bl karminrot, 150 cm, September/Oktober 4 – 'Andenken an Alma Pötschke', Bl auffallend lachsrot, 80 cm, September/Oktober T 4 – 'Rudelsburg', Bl leuchtend lachsrosa, 110 cm Sept./Okt. T 4 – 'Rudelsburg', Bl leuchtend lachsrosa, 110 cm Sept./Okt. T 4 – 'Treasure', Bl dunkellila, 150–180 cm, Sept./Okt. 4	
Glattblattastern: Auffallend reichblühende Staude, die zur Gruppenpflanzung und als Schnittblume geschätzt wird. N.: <i>Chrysanthemum hort.</i> , <i>Helenium</i> , <i>Solidago</i> . novi-belgii 'Crimson Brocade', Bl leuchtend-rot, 80–100 cm, September/Oktober T 4 – 'Eventide', Bl tiefviolett, halbgefüllt, großblumig, 100–120 cm, September/Oktober T 4 – 'Fellowship', NEUEIT, Bl reines Rosa, gefüllt, 80 cm, September T 4 – 'Marie Ballard', Bl hellblau, gefüllt, 80–100 cm, September/Oktober T 4 – 'Patricia Ballard', Bl tiefrosa, 100 cm, Sept./Okt. T 4 – 'Royal Blue', Bl leuchtend blau, 100–120 cm, September/Oktober T 4 – 'Schneekuppe', (G. A.), Bl weiß, 100–120 cm, Sept./Okt. T 4 tongolensis 'Leuchtenburg'. (Frühlingsaster) NEUEIT, Schnittsorte, Bl amethystviolett mit orange-farbenem Kopf, 40 cm, Juni T 3	



Aster dumosus, Kissenaster

Astilbe arendsii (G. A.), Prachtspiere

Astilbe – Prachtspiere – Saxifragaceae – ◐

Wenige Pflanzengruppen nur zeigen den Erfolg zielbewußter Zuchtarbeit so auffällig, wie gerade Astilben. Um die Jahrhundertwende waren nur weißblühende, niedrige Arten mit gedrunghenen Rispen bekannt. Aus dem fernen Osten gelangten dann lilarosa- und purpurfarbene, schlankrispige Arten in unseren Betrieb, wo durch sorgfältige Kreuzungen und Auslesen eine neue Rasse entstand, die den Namen des Züchters 'Astilbe Arendsii-Hybride' trägt. Die Farbskala der auch in der Rispenform sehr unterschiedlichen Sorten umfaßt heute alle Töne vom reinen Weiß bis zum leuchtenden Rot, von Lila bis Purpur. An halbschattigen bis schattigen Plätzen fühlen sich die Astilben bei genügender Feuchtigkeit wohl.

N.: Cimicifuga, Filipendula, Ligularia, Rodgersia.

Arendsii-Hybride 'Amethyst', (G. A.), Bl purpur-lila, 80–100 cm, Juli 4

– **'Anita Pfeifer', (G. A.)** Bl lachsrosa, 70–80 cm, Juli/August 4

– **'Bergkristall', (G. A.),** Bl weiß, 80–100 cm, Aug. 4

– **'Brautschleier', (G. A.)** Bl schneeweiß, überhängend, 60–70 cm, Juli 4

– **'Cattleya', (G. A.),** Bl cattleyenrosa, 100 cm, Aug. 4

– **'Diamant', (G. A.),** Bl weiß, 80–90 cm, Juli 4

– **'Else Schluck', (G. A.),** Bl leuchtendrot, 50–60 cm, August 4

– **'Fanal', (G. A.),** B dunkellaubig, Bl granatrot, 60–80 cm, Juli 4

– **'Feuer', (G. A.),** Bl lachsrot, 80–100 cm, August 4

– **'Finale', (G. A.),** Bl reinrosa, 50 cm, Aug./Sept. 4

– **'Gloria', (G. A.),** Bl lilarosa, 50–60 cm, Juli/Aug. 4

– **'Glut', (G. A.),** B dunkellaubig, Bl glutrot, im Verblühen noch lange ansehnlich, 80–100 cm, Aug. 4

– **'Grete Püngel', (G. A.),** Bl hellrosa, 60–80 cm, Juli 4

– **'Hyazinth', (G. A.),** Bl lilarosa, 80–100 cm, Juli/August 4

– **'Intermezzo', (G. A.),** Bl lachsrosa, 40–50 cm, August/September 4

– **'Lilli Goos', (G. A.),** Bl korallenrot, 70–80 cm, Juli/August 4

– **'Serenade', (G. A.),** Bl ericarosa, 40 cm, Aug./Sept. 4

– **'Spinell', (G. A.),** Bl rot, 100 cm, Juli/August 4

– **'Weiße Gloria', (G. A.),** Bl weiß, 50–60 cm, Juli/August 4

Japonica-Hybride 'Bremen', (G. A.), Bl dunkelrosa, 50 cm, Juli 4

'Europa' (G. A.) Bl hellrosa, 50 cm, Juni/Juli 4

– **'Mainz', (G. A.),** Bl lilarosa, 50–60 cm, Juni/Juli 4

– **'Montgomery',** B dunkellaubig, Bl leuchtendrot, 50–60 cm, Juli 4

– **'Möwe', (G. A.),** Bl lachsrosa, 50–60 cm, Juli 4

– **'Ober Gärtner Jürgens',** B dunkellaubig, Bl karminrot, 50–60 cm, Juli 4

Simplicifolia-Hybride 'Alba', (G. A.), Bl weiß mit rosa Hauch, 40–50 cm, August 4

– **'Atrorosea', (G. A.),** Bl dunkelrosa, 40–50 cm, Aug. 4

– **'Bronce Elegans', (G. A.),** B dunkellaubig, Bl dunkelrosa, überhängend, 40 cm, August 4

– **'Delicata', (G. A.),** Bl hellrosa, 40–60 cm, August 4

– **'Dunkellachs', (G. A.),** B dunkellaubig, Bl lachsrosa, 40–50 cm, August 4

– **'Elegans', (G. A.),** Bl leuchtendrosa überhängend, 40 cm, August 4

– **'Praecox', (G. A.),** Bl lachsrosa, 40–50 cm, Juli 4

– **'Praecox Alba', (G. A.),** Bl weiß, 40–50 cm, Juli 4

– **'Rosea', (G. A.),** Bl rosa, 40–50 cm, August 4

Astilbe taquetii 'Superba', (G. A.), Bl purpurrosa, wertvolle Wildstaude, 80–100 cm, August/September 4

Astilbe thunbergii hybr. 'Moerheimii', Bl weiß, überhängend, 100–120 cm, Juli/August 4

Astilbe thunbergii 'Prof. v. d. Wielen', Bl weiß, überhängend, 120–150 cm, Juli/August 4

– **'Straußenfeder', (G. A.),** Bl lachsrosa, überhängend, 80–100 cm, August 4


Astrantia – Sterndolde – Umbelliferae – ○ ◐ ✕

– **'major Rosea',** Bl rosa, 60–80 cm, Juli/Aug. 5



Astilbe arendsii 'Cattleya' (G. A.), Prachtspiere
 Astilbe Simplicifolia-Hybride (G. A.)
 Astilben-Beet in Sorten

	Preisgruppe
Bergenia – Bergenie – Saxifragaceae – ○ ●	
Eine genügsame, fast unverwüstliche Staude, die wenige Ansprüche an Boden und Belichtung stellt, mit lederen, im Herbst und Winter gut gefärbten Blättern.	
N.: Farne, Pachysandra, Sedum spectabile, Stachys lanata	
cordifolia , Bl dunkelrosa, 30 – 40 cm, April/Mai . . . T	4
Hybride 'Abendglut' , (G.A.), 'Highly Commended' der Royal Horticultural Society (England), B im Herbst broncebraun, Bl dunkelpurpurrot, 20–30 cm, April/Mai	6
– 'Morgenröte' , (G.A.), Bl leuchtendrosa, gut nachblühend, 20 – 30 cm, April/Mai	6
– 'Silberlicht' , (G.A.), 'Award of Merit' der Royal Horticultural Society (England), Bl weiß, blaßrosa getönt, 40 cm, April/Mai	6
NEUHEITEN 1971:	
– Abendglocken (G. A.), B rötlich-grün, Bl lockere, dunkelrote Glocken, festgestielt, 40 cm, April/Mai	9
– Purgglocken (G. A.), B grün, Bl glockig, purpurrot, nachblühend, 40 cm April/Mai	9
Brunnera – Kaukasusvergißmeinnicht – Boraginaceae – ○ ●	
Anspruchslose, dennoch wirkungsvolle Frühlingsstaude mit einem reichen Flor vergißmeinnichtartiger Blüten.	
N.: Dicentra, Doronicum, Euphorbia polychroma.	
macrophylla , B herzförmig, Bl blau, 50 cm, April/Mai T	3
Buphthalmum – Goldmargerite – Compositae – ○ ✂	
Willig wachsende Beet- und Gruppenstaude mit Wildpflanzencharakter und langer Blütezeit.	
N.: Chrysanthemum max., Erigeron, Geum.	
salicifolium , Bl goldgelb, 50 – 70 cm, Juni/Juli . T	2
Caltha – Sumpfdotterblume – Ranunculaceae – ○ ●	
Ähnlich der Wildform gedeiht auch diese Art an feuchtem Standort.	
N.: Filipendula hexapetala, Myosotis pal., Ranunculus.	
palustris 'Multiplex' , Bl goldgelb, gefüllt, 30 cm, April/Mai	4
Campanula – Glockenblume – Campanulaceae – ○ ● ✂	
Eine in jedem Gartenboden gedeihende Schmuck- und Schnittstaude mit meist großen, glockigen Blüten.	
N.: Chrysanthemum max., Oenothera, Lythrum.	
glomerata 'Dahurica' , Bl dunkelviolet, 50 – 60 cm Juni/Juli	2
latifolia var. macrantha , Bl blauviolett, 100–120 cm, Juni/Juli	2
– 'Alba' , Bl weiß, 100 – 120 cm, Juni/Juli	2
persicifolia 'Grdf. Alba' , Bl weiß, 80–100 cm, Juli T	2
– 'Grdf. Coerulea' , Bl blau, 100 cm, Juli . . . T	2
Centaurea – Kornblume – Compositae – ○ ✂	
Eine reichblühende Beet- und Schnittstaude für sonnige und trockene Lagen.	
N.: Campanula glomerata, Chrysanthemum max., Papaver.	
dealbata 'Steenbergi' , B grau, fiederschnittig, Bl purpurrot, 70 – 80 cm, Mai/Juni T	4
macrocephala , Bl gelbe Blütenkugeln aus braunschuppigen Knospen. Besondere Solitärpflanze! 120 cm, Juli-September T	4
montana 'Grandiflora' , B grau, Bl leuchtend blau, 40 – 50 cm, Mai/Juni. T	3
Chelone – Schildblume – Scrophulariaceae – ○ ✂	
Gute, wenig bekannte Wildstaude für feuchten Standort mit dunkelrosa Blüten, die an Löwenmäulchen erinnern.	
N.: Lysimachia, Lythrum, Thalictrum.	
obliqua , B glänzend grün, Bl dunkelrosa, 70 – 80 cm August/September.	4



Astilbe arendsii, Anzuchtbeete

Bergenia hybrida 'Silberlicht' (G. A.), Bergenie

Campanula latif. macrantha, Glockenblume

Chrysanthemum – Gartenchrysantheme – Compositae—○✂

Herbstchrysanthemen:

Unentbehrliche, farbenprächtige Herbststauden für sonnigen Standort mit vielgestaltigen Blüten- und Wuchsformen.

N.: Aconitum arendsii, Helenium, Herbstastern.

hortorum 'Anneliese Kock' , Bl weiß, mittelgroß, 80–100 cm, September/Oktober T	2
– 'Clara Curtis' , Bl rosa, einfach, reichblühend, 60 cm, September/Oktober T	2
– 'Citrus' , (G.A.), Bl gelb, halbgefüllt, 70–80 cm, September/Oktober T	2
– 'Denise' , Bl goldgelb, pomponblütig, Massenblüher!, 40 cm, August/Oktober T	2
– 'Fellbacher Wein' , Bl weinrot, halbgefüllt, 60–80 cm, September/Oktober T	2
– 'Goldbronze' , (G. A.), Bl bronze, halbgefüllt, 70–80 cm, September/Oktober T	2
– 'Hansa' , Bl altrosa, mittelgroß, 80–100 cm, September/Oktober T	2
– 'Hebe' , Bl reinrosa, einfach, 70–80 cm, September/Oktober T	2
– 'Lipstick' , Bl dunkelrot, gefüllt, 40 cm, September/Oktober T	2
– 'Mandarin' , Bl gelborange, gefüllt, 60–80 cm, September/Oktober T	2
– 'Paul Boissier' , Bl orange, gefüllt, 60–80 cm, September/Oktober T	2
– 'Rosenkavalier' , Bl lilarosa, gefüllt, 80–100 cm, September/Oktober T	2
– 'Schleswig Holstein' , Bl gelb, mittelgroß, 80–100 cm, September/Oktober T	2
– 'Schweizerland' , Bl gefüllt, schönes Rosa, 80 cm, September/Oktober T	2
– 'Sequoia' , Bl hellbronze, gefüllt, 80–100 cm, September/Oktober T	2
– 'Sioux' , (G. A.), Bl orangerot, einfach, 50–60 cm, September/Oktober T	2
serotinum (Oktobermargerite), Bl weiß einfach, 130 cm, September/Oktober T	3

Frühlingsmargeriten:

Eine frühblühende, unentbehrliche Beet- und Schnittstauden für sonnigen Standort.

N.: Geum, Doronicum, Heuchera.

leucanthemum 'Hofenkrone' , Bl weiß, dicht- gefüllt, straffstielig, 50 cm, Mai/Juni	4
– 'Maistern' , Bl weiß, einfach, 60 cm, Mai/Juni . . T	2

Sommermargeriten:

Starkwachsende, vielseitig verwendb. Gruppen- u. Schnittstauden mit großen, einfachen, wie auch gefüllten Blumen.

N.: Delphinium, Heliopsis, Phlox paniculata.



maximum 'Polaris' , Bl weiß, großblumig, 70–80 cm, Juli/August T	2
– 'Schwabengruß' , Bl weiß, dichtgefüllt, 70–80 cm, Juli/August	4
– 'Silberprinzesschen' , Bl weiß, 30–40 cm, Juni/August T	2
– 'Wirral Supreme' , Bl weiß, gefüllt, 70–80 cm, Juli/August T	4

Bunte Margeriten:

Dankbare und eine der besten Schnittstauden für sonnige Lagen, mit feingefiedertem Laub und ansprechenden Blütenfarben.



N.: Erigeron, Frühlingsmargeriten, Polemonium

coccineum 'Eileen M. Robinson' , Bl reinrosa, großblumig, 60–80 cm, Mai/Juni	4
– 'Laurin' (G. A.), Zwergsorte, kompakter Wuchs, Bl reinlachs, 30 cm, Mai/Juni	5
– 'Regent' , (G. A.), Bl rot, 60–80 cm, Mai/Juni . .	4
– 'Robinsons Rote' , Bl rot, 60–80 cm, Mai/Juni T	2
– 'Robinsons Rosa' , Bl rosa 60–80 cm, Mai/Juni T	2



Chrysanthemum rubellum 'Clara Curtis', Herbstchrysantheme
Chrysanthemum maximum, Margeritenblume
Chrysanthemum arcticum 'Schwefelglanz' (G. A.),
 Grönlandmargerite

	Preisgruppe
Chrysanthemum - Fortsetzung	
Grönlandmargeriten:	
Kräftig wachsende, niedrige Spätherbstblüher für sonnigen Standort	
N.: [Aster dumosus, Polygonum affine, Stachys.	
arcticum , Bl weiß, 30 – 40 cm, Oktober T	2
– 'Roseum', Bl rosa, 40 – 50 cm, Sept./Okt . . . T	2
– 'Schwefelglanz', (G. A.), Bl hellgelb, 40 – 50 cm, September/November T	2
Cimicifuga – Silberkerze – Ranunculaceae – ☉	
Diese wirkungsvollen Schmuckstauden mit ihren dekorativen Blütenähren eignen sich zur Einzel- wie auch zur Gruppenpflanzung im lichten Halbschatten.	
N.: Aconitum, Astilben, Anemone japonica.	
cordifolia , B herzförmig, Bl rahmweiß, 120 – 150 cm, August/September T	6
racemosa , Bl weiß, bizarr, 150 – 180 cm, Juli/August	6
ramosa , Bl cremeweiß, 180 – 200 cm, Aug./Sept. . T	6
simplex 'Armleuchter' , Bl weiß, stark verzweigte Blütenähren, 120 – 150 cm, September/Oktober . T	6
Convallaria – Maiglöckchen – Liliaceae – ○☉✂	
Allgemein bekannter Bodendecker für halbschattigen bis schattigen Standort, insbesondere zur Unterpflanzung von Gehölzen.	
N.: Asperula, Epimedium, Omphalodes, Vinca.	
majalis, 'Grandiflora' , Bl weiß, 20 cm, Mai . . . T	2
Coreopsis – Mädchenauge – Compositae – ○✂	
Anspruchslose Dauerblüher zur Gruppenpflanzung und Schnittblumengewinnung.	
N.: Erigeron, Salvia superba, Veronica long, Blauriesin.	
grandiflora 'Badengold' , Bl goldgelb, gute Schnittblume. 80 cm, Juni/Juli. Rückschnitt im Oktober, damit sie nicht auswintern T	3
verticillata 'Grandiflora' , B nadelförmig, Bl gelb, Dauerblüher, 50 – 60 cm, Juli/September T	2
Delphinium – Rittersporn – Ranunculaceae – ○✂	
Eine der wirkungsvollsten Schmuck- und Schnittstauden für sonnigen Standort und nahrhaften Boden. Ein Rückschneiden auf 10–15 cm über dem Erdboden nach der Hauptblüte wird mit einer guten Nachblüte im Herbst belohnt.	
N.: Achillea, Chrysanthemum max., Monarda.	
Hybride (Belladonna-Gruppe),	
– 'Völkerfrieden', Bl leuchtend enzianblau, gut nachblühend, 80 – 100 cm, Juni/August . . .	6
Hybride (Cultorum-Gruppe),	
– 'Amorspeer', Bl leuchtend hellblau mit dunklem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August T	8
– 'Berghimmel', Bl hellblau mit weißem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August T	8
– 'Blauwal', Bl dunkelblau, früh, reichblühend, 150 – 180 cm T	8
– 'Finsteraarhorn', Bl dunkelenzianblau mit dunklem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August . T	8
– 'Lanzenträger', Bl leuchtend enzianblau mit großem weißem Auge. Robust und standfest, 200 cm, Juli/August T	8
– 'Jubelruf', Bl leuchtend reinblau, schöne lange schmale Rispen, 180 cm, Juli/August	8
– 'Junior', Bl mittelblau mit schwarzem Auge, 160 cm, Juli/August T	8
– 'Schildknappe', Bl enzianblau mit weißem Auge, 170 cm, Juli	8
– 'Dunkelblau', Bl dunkelbl., 150–180 cm, Juli/Aug. T	5
– 'Hellblau', Bl hellblau, 150 – 180 cm, Juli/August T	5
Hybride (Pacific-Hybriden-Gruppe),	
– 'Rosa Sensation', Bl großblumig, halbgefüllt oder gefüllt in Rosa-Tönen, 150 cm, Juli/August . . T	5
– 'Weißer Herkules', Bl reinweiß, großblumig, 180–200 cm, Juli/August T	5




Cimicifuga japonica 'Acerina', Silberkerze

Cimicifuga simplex, Silberkerze

Coreopsis verticillata grdf., Mädchenauge

	Preisgruppe
Dicentra – Tränendes Herz – Papaveraceae – ○ ◐ Eine der beliebtesten Gartens- tauden für halbschattigen Standort. N.: Doronicum, Epimedium, Polemonium. spectabilis , Bl rosa, überhängd., 50–60 cm, Mai/Juni	5
Dictamnus – Brennender Busch – Rutaceae – ○ ◐ ✕ Interessante Wildstaude für trockene, sonnigen Standort mit aromatisch duft. Pflanzenteilen. N.: Inula orientalis, Nepeta, Salvia sup. fraxinella , B gefiedert, Bl rosa und rot geadert, 80 cm, Juni/Juli T – 'ALBUS' , Bl weiß, 80 cm. Juni/Juli	6 6
Digitalis – Fingerhut – Scrophulariaceae – ○ ◐ Bekannte Wildpflanze für halbschattige Lagen und nicht zu feuchten Standort. N.: Aruncus sylvestris, hohe Campanula, Gräser und Farne. purpurea , Bl purpurrosa, gefll., 120 – 150 cm, Juni/Juli T – 'Gelbe Lanze' , Bl hellgelb, 120 – 150 cm, Juni/Juli T – 'Gloxiniaeflora' , Bl großblumige bunte Mischung, 120 – 150 cm, Juni/Juli T	2 2 2
Doronicum – Gemswurz – Compositae – ○ ◐ ✕ Beliebte Frühlingsstaude für sonnigen bis halbschattigen Standort, die als Lieferant der ersten Schnittblumen im Früh- jahr beliebt ist. N.: Brunnera macrophylla, Dicentra, Polemonium. caucasicum , B glänzend, Bl gelb, 40 cm, April/Mai. – 'Frühlingspracht', Neuheit! , Bl goldgelb, dicht- gefüllt, 40 – 50 cm, April/Mai. plantagineum Excelsum , Bl großblumig, gelb, 80 cm, Mai	2 3 3
Echinops – Kugeldistel – Compositae – ○ ✕ Anspruchslose Schmuck- und Schnittstaude für trockene und sonnige Lagen, wo sie gerne von Schmetterlingen be- sucht werden. N.: Maclaeya, Monarda, Verbascum, Gräser. humilis 'Taplow Blue' , B unterseits behaart, Bl stahlblau, 100 – 120 cm, August/September . . T	5
Erigeron – Feinstrahl – Compositae – ○ ✕ Gute, leichtwachsende Staude mit einer Fülle von asterähn- lichen Blüten, die sich hervorragend zum Schnitt eignen und einen Nachflor im Spätsommer bringen. N.: Bupthalmum salicifolium, Coreopsis, Oenothera. Hybride 'Dunkelste Aller' , Bl violettblau, 60 – 70 cm, Juli T – 'Foerstes Liebling' , Bl rosarot, halbgefüllt, 60 cm, Juni/Juli T – 'Rosa Triumph' , Bl leuchtendrosa, gefüllt, groß- blumig, 60 – 70 cm, Juni/Juli T – 'Schloß Hellenstein' , Bl tiefdunkelviolet mit gold- gelber Mitte, halbgefüllt, 50 – 60 cm, Juni/Juli. T – 'Wuppertal', (G. A.) , Bl lila, halbgefüllt, großblu- mig, 70 – 80 cm, Juni/Juli. T	3 3 4 4 3
Eryngium – Edeldistel – Umbelliferae – ○ ✕ Genügsame und wirkungsvolle Staude, die in trockenen Bö- den und sonnigen Lagen bestens gedeiht. Die stahlblauen Blütenstände werden gerne geschnitten und in Trocken- sträußen verwendet. N.: Gypsophila, Liatris, Gräser, Nepeta, Salvia. alpinum hybridum 'Juwel' (G. A.) , Bl dunkelstahl- blau, großblumig, 70–80 cm, Juni/Juli T – Opal, (G. A.) Bl silbriglila, 80 cm, großblumig, Juni/Juli T – 'Robustum', (G. A.) B geschlitzt. Bl stahlblau, groß- blumig, 50 cm, Juli/August T – 'Violetta', (G. A.) , Bl violettblau, großblumig, 70–90 cm, Juni/Juli T planum , Bl kleinblumig, blau, 80–100 cm, Juli/Aug.	6 6 6 6 3



Delphinium cultorum, Rittersporn
Erigeron hybr. 'Violetta' (G. A.), Feinstrahl
Eryngium alpinum (G. A.), Edeldistel

Eupatorium – Wasserdost – Compositae ○ ● ✂

Robuste Wildstaude, die gerne in Wassernähe Verwendung findet, wo sie auch auf mehr trockenen Plätzen gedeiht.

N.: Lythrum, Thalictrum, Trollius.

purpureum, Bl weinrot, 150 – 200 cm, Juli/Sept.

7

Euphorbia – Wolfsmilch – Euphorbiaceae – ○

Ansehnlicher, schnellwachsender Frühlingsblüher für trockenen und sonnigen Standort. Besonders wirkungsvoll als Solitärpflanze in größeren Anpflanzungen von Polsterstauden.

N.: Geum coccineum, Phlox subulata, Veronica.

polychroma, Bl Hochblätter hellgelb, Blüten gelblich-grün, 50 – 60 cm Mai/Juni T

4

Filipendula – Spierstaude – Rosaceae – ○ ●

Empfehlenswerte Wildstaude zur Verwendung an Teichrändern, Wasserläufen, oder nicht zu trockenen Standorten.

N.: Astilben, Ligularia, Lythrum, Thalictrum.

hexapetala, 'Plena' Bl weiß, gefüllt, 30 – 40 cm, Juni/Juli T

4

purpurea, Bl karminrot, 60 – 80 cm, Juli

5

– 'Elegans', Bl weiß mit roten Staubfäden, 50–60 cm, Juli

5

rubra 'Venusta Magnifica', Bl rosarot, 120–150 cm, Juli/August

5

ulmaria 'Plena', Bl weiß, gefüllt, 80 – 100 cm, Juli

4

Gaillardia – Kokardenblume – Compositae – ○ ✂

Anspruchsloser Dauerblüher, der in keiner Schnittstaudenpflanzung fehlen sollte.

N.: Gysophila, Liatris, Papaver nudicaule, Platycodon.

Hybride 'Burgunder', Bl weinrot, 50 – 70 cm, Juni/Sept. T

2

– 'Kobold', Bl rot-gelb, zwergig, 40 cm, Juni/Sept. T

2

– 'Tokajer', Bl strahlend orangebraun, 70 cm, Juni/Sept. T

2

Gentiana – Schwalbenwurzenzian –

Gentianaceae – ●

Eine sehr wirkungsvolle Wildstaude, die auf mäßig feuchtem Boden in halbschattiger Lage gut gedeiht.

N.: Helleborus, Polygonatum, Pulmonaria.

asclepiadea, Bl dunkelblau, 60 – 80 cm, Juli/Aug.

5

Geranium – Storchschnabel –

Geraniaceae – ○ ●

Widerstandsfähige Schmuckstauden, die selbst noch in trockenen Böden gedeihen und neben ihren Blüten noch durch das im Herbst bunt gefärbte Laub auffallen.

N.: Lupinen, Monarda, Veronica longifolia.

endressii, B hellgrün, Bl reinrosa, 30–40 cm, Juni/Juli

3

grandiflorum 'Johnson's Varietät', B fein zerteilt, Bl blauviolett, 40–50 cm, Juni/Juli

3

macrorrhizum 'Spessart', B zerteilt, Bl zartrosa, wüchsiger, empfehlenswerter Bodendecker, 30 cm, Juni/Juli

3

platypetalum, Bl blauviolett, 60 – 80 cm, Juni/Juli

3

Geum – Nelkenwurz – Rosaceae – ○ ●

Äußerst dankbare und widerstandsfähige Staude für sonnige bis halbschattige Standorte mit erdbeerartigen, lebhaft gefärbten Blüten.

N.: Aquilegia, Euphorbia polychroma, Filipendula hexaptl.

coccineum 'Werner Arends' (G.A.), Bl. orangerot, halbgefüllt, gut nachblühend, 20 cm, Mai/Juni

3

– 'Borisii', Bl mennigrot, 30 cm, Mai/Juli T

2

Hybride 'Mrs Bradshaw', Bl scharlachrot, gefüllt, großblumig, 60 cm, Juni/August T

2

'Goldball', Bl goldgelb, gefüllt, 60 cm Juni/Aug. . . T

2

Gillenia – Dreiblattschiere – Rosaceae – ○ ●

Leider nur wenig verwendete Wildstaude, die zur Belebung halbschattiger Plätze bestens geeignet ist.

N.: Dicentra formosa, Gentiana asclepiadea, Mertensia.

trifoliata, Bl zart weißrosa mit rötlichen Kelchen, 50 – 70 cm, Juni/Juli T

5



Euphorbia polychroma, Kugelwolfsmilch
Helenium hybridum, Sonnenbraut
Heliopsis scabra, Sonnenaug

Gypsophila – Schleierkraut –**Cariophyllaceae – ○ ✕**

Bekannte und allgemein beliebte Staude zur Auflockerung von Staudenpflanzungen und als Schnittblume unentbehrlich in bunten Sommerblumensträußen.

N.: Heliopsis, Monarda, Phlox.

paniculata 'Bristol Fairy', Bl weiß, gefüllt,
80–100 cm, Juli/August T

5

Helenium – Sonnenbraut – Compositae – ○ ✕

Eine Schnitt- und Schmuckstaude, die zur Belebung des hochsommerlichen und herbstlichen Staudengartens gerne verwendet wird.

N.: Herbstastern, Phlox, Solidago, Scabiosa.

bigelovii 'The Bishop', Bl gelb mit brauner Mitte,
40–50 cm, Juli/August T

4

hybridum 'Golddrausch', Bl goldgelb mit brauner
Mitte, 120–150 cm, August/September T

4

– **Königtiger**, Bl mitte goldgelb, zum Rand hin rot-
braun übergehend gute Zweifarbenwirkung, 150 cm,
Juli/September T

4

– **'Moerheim Beauty'**, Bl samtig rotbraun, 60–80 cm,
Juli/August T

4

– **Wonadonga**, Bl rotbraun, 100 cm, August/Sep-
tember T

4

Helianthus – Sonnenblume – Compositae – ○ ✕

Hohe Schnitt- und Schmuckstaude, die das herbstliche Bild des Gartens eindrucksvoll betont.

N.: Herbstastern, Macleaya, Chrysanthemum serotinum

atrorubens, Bl goldgelb, großblumig, 150–200 cm,
September/Okttober T

4

salicifolius, B weidenartig, Bl gelb, kleinblumig,
200 cm, Oktober T

5

Heliopsis – Sonnenauge – Compositae – ○ ✕

Diese sonnenblumenartige Staude zeichnet sich durch eine sehr lange Blütezeit besonders aus. Die meist goldgelben Blüten zählen zu den haltbarsten Schnittblumen.

N.: Delphinium, Monarda, Phlox, Veronica longifolia

scabra 'Goldgefieder', Bl goldgelb, dichtgefüllt,
120–150 cm, Juli/September. T

5

– **'Karat'**, Bl goldgelb, halbgefüllt, großblumig,
100–120 cm, Juli/September. T

5

– **'Sonnenschild'**, Bl goldgelb mit grüner Mitte,
100–120 cm, Juli/September T

5

– **'Spitzentänzerin'**, Bl leuchtend goldgelb, halb-
gefüllt, feinstrahlig, 120–150 cm, Juli/Sept. . T

5

Helleborus – Christrose –**Ranunculaceae – ◐ ● ✕**

Eine der beliebtesten Stauden, die schon im Winter mit ihren weißen Blüten den Frühling ahnen lässt. Zum guten Gedeihen wünscht sie einen nährhaften humosen Lehmboden in halbschattiger bis schattiger Lage.

N.: Hacquetia, Hepatica, Lathyrus, Vinca.

Hybride hortorum, B lederartig, wintergrün,
Bl weiß, rosa und rot, 30–40 cm, Februar/April . . .

ab 9

niger 'Grandiflorus', B wintergrün, Bl weiß,
großblumig, 30–40 cm, Dezember/März T

ab 8

Hemerocallis – Taglilie – Liliaceae – ○ ◐

Äußerst robuste Schmuckstaude zur vielseitigen Verwendung, besonders reizvoll in Wassernähe.

N.: Iris sibirica, Kniphofia, Lythrum, Tradescantia.

conspicua, Bl braunrot mit gelben Streifen, 70–80 cm,
Juli/August

6

Hybride 'Aten', Bl groß, tieforange, von glatter
Form, 110 cm, Juli/August.

9

– **'Atlas'**, Bl riesig, in schönstem Hellgelb mit leicht
gewellten Rändern und von bester Substanz,
110 cm, Juli/August

8

– **'Crimson Pirate'**, Bl leuchtendes, klares Rot, wenig
orange Schlund, kleinblumig und von sterniger
Form. Hervorragende Sorte, reich und lange blü-
hend, 70 cm, Juli/August


8

– **'Frans Hals'**, zweifarbig Sorte von großer Leucht-
kraft. Bl Petalen orangerot und Sepalen rahmgelb.
Starkwüchsig, reichblühend, 90 cm, Juli/August .

10

– **'Neyron Rose'**, Bl rund, eigenartiges Mittelrot bis
Rosenrosa, klar abgesetzter heller Nerv, 70 cm,
Juli/August

10



Helleborus Hybride hort., glockige Christrose
Helleborus niger grandiflorus, Christrose
Hemerocallis-Hybride, Taglilie

	Preisgruppe
Heracleum – Herkuleskraut – Umbelliferae – ○ ● Riesige Solitärstaude mit dekorativem Laub und großen Blüteschirmen. Wichtig erscheint der Hinweis, daß die Berührung der Pflanzenteile unangenehme Hautreizungen zur Folge haben kann. villosum, B stark zerteilt, Bl weiß, 200 – 300 cm, Juni/Juli T 7	
Heuchera – Purpurglöckchen – Saxifragaceae – ○ ● ✂ Kleinstaupe mit wirkungsvollem Laub und zierlichen Blüten- glöckchen für sonnige bis halbschattige Lagen. N.: Gypsophila rep. Rosenschleier, Oenothera, Viola. Hybride 'Bressinghams Hybriden', B wintergrün, Bl rosa bis rot, 40 – 50 cm, Juni/Juli T 3 – 'Weserlachs', wintergrün Bl kräftig lachsrosa, straff gestielt, 50 – 60 cm, Juni/August T 4	
Hosta – Herzlilie – Liliaceae – ○ ● ● Eine unverwüsthche Staude, die mit ihrem oft interessant ge- färbten Blattwerk selbst dunkelste Stellen des Gartens belebt. N.: Aruncus, Lamium, Pachysandra, Gräser und Farne. albo-marginata, B grün mit weißem Rand, Bl lila, 40 – 50 cm, Juli/August. T 4 fortunei 'Aurea', B goldbunt, im Sommer vergrü- nend, Bl lila, 60 cm, Juli. T 4 sieboldiana 'Elegans' (G.A.) B stahlblau, breitherz- förmig, Bl lila, 50 – 70 cm, Juli/August T 4 ventricosa, B grün, Bl lila, 50 – 70 cm, Juli/August T 4	
Inula – Alant – Compositae – ○ ✂ Starkwachsende Wildstauden ohne besondere Ansprüche, insbesondere für stark sonnigen Standort. N.: Echinops, Lupinen, Macleaya. magnifica, Bl orangegelb, strahlenförmig, großblumig, Solitärstaude l, 200 cm, Juli/August . . 7 orientalis, Bl orangegelb, haltbare Schnittblume, 50 – 60 cm, Juni/Juli T 3	
Iris – Schwertlilie – Iridaceae – ○ ✂ Allerorts gut bekannte Schmuck- und Schnittstaude mit vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten. N.: Hemerocallis, Kniphofia, Kentranthus, Lythrum. D = Dom (obere, gewölbte Blütenblätter) H = Hängeblätter germanica 'Allegiance', Domblätter herrliche blaue Seide, Hängeblätter sehr samtig, goldener Bart. Großblumige Sorte, die alle guten Eigenschaften ver- einigt und als blaueste der dunklen Sorten Weltruf hat. Dykes Medal 1964. Ende Mai, 100 cm 9 – 'Fuchsjagd', Bl sehr einheitliches, richtiges Fuchs- rot, nicht dunkel und ohne Samt, mittelgroß, gut verzweigt, auffallende Farbe. Bekam 1961 in Florenz den Preis der Stadt für die beste rote Iris. Mitte Mai, 80 cm. 10 – 'Gaucho', Bl D = gelb, H = braunrot, 100 cm, Mai/Juni 5 – 'Ginger', Bl leuchtend goldbronze, H = mittelbraun, was die Wirkung erhöht, reichblühend und gut ver- zweigt. Mitte-Ende Mai. 90 cm 8 – 'Golden Delight', Bl goldgelb, stark gewellt, lederartige Substanz, Anfang–Mitte Mai, 80 cm. . . 11 – 'Great Lakes', Bl leuchtendblau 120 cm, Mitte Mai 6 – 'Jane Philipps', Bl sehr groß, hellblau, von bester Form. Beliebte Sorte, Mitte Mai, 80 cm 6 – 'L'Litta', Bl hübsches, helles Lachsrosa, sehr an- sprechend, waagerechte H. Reichblühend, aus- gezeichnete Substanz, Mitte Mai, 60 cm. 11 – 'Moonlight Sonata', Bl kühles Mittelgelb, ein- schließlich Bart. Von sehr besonderer Note. Wüchsig und gut. Ende Mai, 80 cm 6 – 'Ola Kala', Bl tief goldgelb, hervorragende Sorte. Ende Mai – Anfang Juni, 90 cm 6 – 'One Desire'. Das echte Rosa ist auch unter den neuen Iris selten. Hier ist eine Sorte, die weder bläu- lich noch aprikosenrosa ist, sondern ein wirkliches, reines Rosa. Bl glatt und von guter Substanz. Die Sorte gilt als eine der besten. Anfang – Mitte Mai, 70 cm. 12 – 'Pacemaker', Bl warmes, dunkles Rot ohne Schlundaderung. Anfang – Mitte Mai, 90 cm . . . 8	



Hosta undulata 'Albomarginata', Wellige Weißrand-Funkie

Hosta fortunei 'Stenantha', Große Grünblattfunkie

Hosta sieboldiana 'Elegans', Große Blaublattfunkie

Iris - Fortsetzung

- '**Pierre Menard**', Bl wundervolles Mittelblau, hellgelber Bart, glatte Form, schwebende H. Klassische und ausgezeichnete Sorte. Ende Mai, 90 cm 8
- '**Pink Bountiful**', Bl lilarosa, 100 cm, Mitte Mai 8
- '**Royal Coach**', Bl olivgelb, dunkel geadert, eine ausgefallene Farbe, 60–80 cm, Mai/Juni 7
- '**Sable**', Bl tiefstes Violettblau, H schwarz, stahlblauer Bart, Anfang – Mitte Mai, 100 cm 6
- '**Sérénité**', Bl D = broncegelb, H = silbrigblau, sehr aparte und formschöne Blüte, 100 cm, Juni 6
- '**White Knight**', Bl schneeweiß, ausgezeichnete Gruppensorte für den Vordergrund, Anfang – Ende Mai, 60 cm 5
- '**Winter Carnival**', Bl groß, schneeweiß von bester Substanz, gelber Schlund und Bart, Mitte – Ende Mai, 110 cm 5
- kaempferi**, Japanische Schwertlilie für feuchten bis sumpfigen Standort. Bl aparte Farben in bunter Mischung, 60–80 cm, Juli 6
- sanguinea**, schmalblättrige Wildiris für feuchten Standort geeignet. Bl leuchtendblau, 60–80 cm, Juni 4
- sanguinea** '**Schneekönigin**', Bl weiß, 60–80 cm, Juni 4
- sibirica** '**Caesar's**', Sibirische Iris, die ebenfalls in feuchten bis sumpfigen Böden gedeiht. Bl tiefveilchenviolett, großblumig, 80–100 cm, Juni 5
- sibirica** '**Strandperle**', Bl hellblau, 80–100 cm, Juni 4

Kentranthus – Spornblume –

Valerianaceae – ○ ✕

Dankbarer und anspruchsloser Dauerblüher, der überall dort mit seinen roten Blüten erfreut, wo es trocken und sonnig ist.

N.: Buphthalmum, Nepeta, Oenothera.

- ruber** '**Coccineus**', Bl leuchtend rot, 60–80 cm, Juni/September T 2

Kirengeshoma – Wachsglocke –

Saxifragaceae – ◐ ◑

Wertvolle Schattenpflanze, die noch im späten Herbst mit ihren mattgelben Blüten überrascht.

N.: Anemone japonica, Hosta, Tiarella cordifolia.

- palmata**, B herzförmig, dekorativ, Bl mattgelb, 50–60 cm, August/Oktober T 7

Kniphofia – Fackellilie – Liliaceae – ○ ✕

Wirkungsvolle Schnitt- und Schmuckstaude mit schilfartigem Laub und schlanken Blütenkolben.

N.: Liatris, Iris, Hemerocallis, Gräser.

- Hybride** '**Elegans Multicolor**', Bl orangegelb, 70–80 cm, Juni/August T 4
- '**Expreß**', (G. A.), Bl orange, 80–100 cm, Juni/Juli T 4

Lathyrus – Frühlingswaldwicke –

Leguminosae – ◐ ◑

Eine Wildstaude, die mit als erster Frühlingsblüher selbst an schattigen Plätzen noch gedeiht.

N.: Brunnera, Primeln, Pulmonaria.

- vernus**, Bl purpurrot bis blauviolett, 30–40 cm, März/April T 3
- '**Albo-Roseus**', Bl weiß-rosa, 30–40 cm, März/April T 4

Liatris – Prachtscharte – Compositae – ○ ✕

Überall an sonnigen Plätzen kann diese äußerst dankbare Wildstaude Verwendung finden.

N.: Heidepflanzen, Gräser, Oenothera, Polsterpflanzen.

- spicata**, B grasartig, Bl purpurviolett, Blütenähre von oben nach unten aufblühend, 50–60 cm, Juli/Aug. T 2

Ligularia – Riesenkreuzkraut –

Compositae – ○ ◐ Eine wirkungsvolle Solitärstaude mit auffallender Belaubung für nicht zu trockene, tiefgründige Böden vor Gehölzgruppen und in Wassernähe.

N.: Aruncus, Filipendula, Lythrum.

- clivorum** '**Desdemona**', B purpurrot, Bl dunkelorange, 80–100 cm, August/September 6
- '**Orange Queen**', Bl orange, großblumig, 100–120 cm, August/September 6



Inula orientalis, Alant

Inula afghan, magnifica, Alant

Iris kaempferi, japanische Schwertlilie

	Preisgruppe
Ligularia - Fortsetzung	
x hessei , Bl gelb, kolbenförmig, 150–200 cm, Juli/August	6
x palmatiloba , B stark zerteilt, Bl leuchtendgelb, 120–150 cm, Juni/Juli	6
przewalskyi , B fingerförmig zerteilt, Bl gelb, ährenförmig, 80–100 cm, Juli/September	6
stenocephala 'Globosa', Bl gelb, 100–120 cm, Juli/August	6
Lupinus – Wolfsbohne – Leguminosae – ○ ✂	
Für sonnige Lagen eine farbenprächtige Staude, die eigent- lich in keinem Garten fehlen dürfte.	
N.: Gypsophila, Hemerocallis, Papaver.	
Russell-Hybriden:	
'Edelknaben', Bl karminrote Töne, 80–100 cm, Juni/Juli T	4
'Kastellan', Bl blau mit weiß, 80–100 cm, Juni/Juli T	4
'Kronleuchter', Bl gelbe Töne, 80–100 cm, Juni/Juli T	4
'Schloßfrau', Bl rosa mit weiß, 80–100 cm, Juni/Juli T	4
Lychnis – Brennende Liebe –	
Caryophyllaceae – ○ ✂	
Allgemein bekannte und beliebte Gartenstaude, die mit ihrem einmaligen Rot in jeder Staudenpflanzung auffällt.	
N.: Achillea, Chrysanthemum max., Delphinium.	
chalconica , Bl feuerrot, 100–120 cm, Juni/Juli T	2
Lychnis – Pechnelke – Caryophyllaceae – ○ ✂	
Anspruchsloser Frühlingsblüher mit dichtgefüllten, nelken- artigen Blüten zur Verwendung zwischen Polsterpflanzen und als Schnittblume.	
N.: Aster tongolensis, Eriophyllum, Frühlingsmargeriten.	
viscaria 'Plena', Bl karminrot, gefüllt, 40 cm, Mai/Juni T	2
Lysimachia – Gelbweiderich –	
Primulaceae – ○ ● Starkwachsende Wildstaude für sonnigen bis halbschattigen Standort.	
N.: Lythrum, Mertensia, Rodgersia.	
punctata , Bl gelb, blattachselständig, 80–100 cm, Juni/Juli	2
Lythrum – Blutweiderich – Lythraceae – ○ ●	
Ein beliebter Dauerblüher, der sich in Wassernähe, d. h. in feuchten Böden wohlfühlt.	
N.: Filipendula, Myosotis palustris, Thalictrum.	
salicaria 'Robert', Bl karminr., 60–70 cm, Juli/Aug. T	4
virgatum 'Rose Queen', Bl rosarote zierliche Blüten- rispen, 60 cm, Juli/August	4
Macleaya – Federmohn – Papaveraceae – ○ ●	
Dekorative Solitärstaude für einen besond. Platz im Garten.	
cordata 'Korallenfeder', Bl. korallenfarbig, B grau- blau, großlappig, 180–200 cm, Juli/Sept.	6
Monarda – Indianernessel – Labiatae – ○ ● ✂	
Raschwachsende, anspruchslose Schmuckstaude für son- nige bis halbschattige Lagen, wo sie selbst noch in trocken- sten Böden gedeiht.	
N.: Achillea, Kentranthus, Phlox.	
Hybride 'Cambridge Scarlet', Bl scharlachrot, 80–120 cm, Juni/August	4
– 'Croftway Pink', Bl lachsrosa, 100–120 cm, Juni/August	4
– 'Präriebrand', Bl dunkellachsr., 150 cm, Juni/Aug.	4
– 'Prärienacht', Bl purpurlila, 120–150 cm, Juni/August	4
Morina – Kardendistel – Dipsacaceae ○	
Dekorative, distelartige Staude, Solitär	
N.: niedrige Gräser, Heide	
longifolia , B lang, dornig gezähnt, Bl weiß mit rosa in übereinanderstehenden Quirlen, 80 cm hohe Blüten- schäfte, Juli/August T	5
Myosotis – Vergißmeinnicht –	
Boraginaceae – ○ ● ✂	
Schnellwachsende Staude für feuchte Plätze in Wassernähe.	
N.: Caltha, Etagen- und Glockenprimeln, Trollius.	
palustris 'Thüringen', Bl blau, 20–30 cm, Mai/September T	1



Liatris spicata, Prachtscharte

Ligularia clivorum 'Desdemona', Riesenkreuzkraut

Ligularia x hessei, Riesenkreuzkraut

Oenothera – Nachtkerze – Oenotheraceae – ○ ×
Gelber Dauerblüher zur Belebung der Staudenpflanzungen.N.: *Liatris*, *Nepeta*, *Potentilla nep.*, *Festuca glauca*.

- tetragona 'Fyrverkeri'**, B rötlich, Bl goldgelb, rötliche Blütenknospen, 40 – 60 cm, Juni/August . T 3
- **'Hohes Licht'**, Bl leuchtendgelb, 60 cm, Juni/August T 3
- **'Yellow River'**, Bl hellgelb, 40–60 cm, Juni/Aug. T 3

Paeonia – Pfingstrose – Ranunculaceae – ○ ◐ ×
Altbewährte Gartenstauden, die sich als sehr dankbar und zuverlässig erweist, wenn man sie ungestört am einmal gewählten Standort belässt.**Duftende Edelpfingstrosen:**

- lactiflora 'Avalanche'**, Bl cremeweiß, sehr schön gefüllt, 80 cm, Juni 7
- **'Duchesse de Nemours'**, Bl grünlichweiß, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni 7
- **'Festiva Maxima'**, Bl weiß, gefüllt, mit einzelnen roten Spitzen, 80 – 100 cm, Juni 7
- **'Inspecteur Lavergne'**, Bl dunkelrot, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni 7
- **'Sarah Bernhardt'**, Bl rosa, gefüllt, 70–100 cm, Juni 7

Bauernpfingstrosen:

- officinalis 'Rosea Plena'**, Bl rosa, gefüllt, 60–80 cm, Mai/Juni 7
- **'Rubra Plena'**, Bl rot, gefüllt, 60 – 80 cm, Mai/Juni 7

Papaver – Mohn – Papaveraceae – ○ ×

Seit Jahrzehnten bekannte Staudenart für sonnigen Standort, wo sie immer wieder durch ihre auffallend großen rosa und roten Blüten beeindruckt.

N.: *Delphinium*, *Gypsophila*, *Iris*.

- orientale 'Marcus Perry'**, Bl orange-scharlach, 50 – 60 cm, Juni/Juli T 4
- **'Beauty of Livermere'**, Bl glühend dunkelrot, großblumig mit gewellten Rändern 80–90 cm, Juni/Juli T 4
- **'Feuerriese'**, Bl ziegelrot, straffstielig, 80 cm, Juni/Juli T 4
- **'Frührot'**, Bl leuchtendrot mit schwarzen Grundflecken, frühblühend, 80 cm, Juni T 4
- **Hybride 'Catharina'**, Bl kräftiges Lachsrosa, innen schwarz gefleckt, 80–90 cm, Juni/Juli T 4
- nudicaule – Islandmohn** –, eine niedrig bleibende Art mit zierlicher Belaubung und haltbaren Schnittblumen in vielen Farben, 30 – 40 cm, Mai/August T 2
- **'Kardinal'**, Bl kirschrot, 30 – 40 cm, Mai/August T 2

Peltiphyllum – Schildblatt –**Saxifragaceae – ◐ ○**


Eine großblättrige, äußerst dekorative Wildstaudenart für feuchte Plätze mit interessanten, auf straffen Stengeln sitzenden Blütendolden, die vor Austrieb des Blattwerkes erscheinen.

N.: *Heracleum*, *Ligularia*, *Macleaya*.

- peltatum**, B schildförm., Bl rosa, 70–80 cm, April/Mai 5

Phlox – Flammenblume – Polemoniaceae – ○ ×Zu den farbenprächtigsten Vertretern unserer Staudenwelt zählen unbestritten die verschiedenen Phlox-Arten. Bereits Mitte Juni erblühen die Frühsommerphlox, die immer noch zu wenig verwendet werden. Erst Mitte September beschließen die letzten Sorten der *Paniculata*-Gruppe den langen Flor der Flammenblumen.N.: *Helenium*, *Heliopsis*, *Scabiosa*.

- paniculata 'A.L.Schlageter' (G.A.)** Bl leuchtendrot, 80 – 100 cm, Juli T 3
- **'Aida'**, Bl rotviolett, 50 – 60 cm, Juli/August . . . T 3
- **'Amethyst'**, Bl hellviolett, 80 – 100 cm, Juli/Aug. T 3
- **'Bauernstolz'**, Bl lilarosa mit rotem Auge, 80 – 100 cm, August T 3
- **'Brigadier'**, Bl ziegelrot, 80 – 100 cm, Juli/August T 3
- **'Cecil Hanbury'**, Bl karminrot mit dunklem Auge, 80 – 100 cm, Juli/August T 3
- **'Dorffreude'**, Bl rosarot, dunkel geaugt, 80 – 100 cm, Juli/August T 3
- **'Early Gem'**, Bl lachsrosa mit rotem Auge, 70 – 80 cm, Juli/August T 3



Paeonia lactiflora, Edelpfingstrose

Papaver nudicaule, Islandmohn

Papaver orientale, Mohn

	Preisgruppe
Phlox - Fortsetzung	
– 'Eva Foerster', Bl lachsrosa mit weißer Mitte, 70–80 cm, Juli/August. T	3
– 'Fesselballon', Bl hellrosa mit rotem Auge, 100–120 cm, Juli/August. T	3
– 'Frau Alfred Mauthner', Bl lachsrot, 80–100 cm, Juli/August T	3
– 'Frauenlob', Bl hellrosa mit rotem Auge, 80–100 cm, Juli/August T	3
– 'Le Mahdi', Bl tiefdunkelblau, 60–70 cm, Juli/ August T	3
– 'Mia Ruys', Bl weiß, großblumig, 60–70 cm, Juli T	3
– 'Orange', Bl orangerot, 80–100 cm, Aug./Sept. T	3
– 'Pastorale', Bl reinrosa, 90–100 cm, Juli/August T	3
– 'Paul Hoffmann', (G. A.), Bl purpurrot, 100–120 cm, Juli/August. T	3
– 'Pax', Bl reinweiß, 80–100 cm, Juli/August . . T	3
– 'Sir John Falstaff', Bl lachsrosa mit dunklem Auge, großblumig, 100–120 cm, Juli/August . T	3
– 'Sommerkleid', Bl weiß mit roter Mitte, 80–100 cm, Juli/August T	3
– 'Spätrot' (Typ Arends), Bl leuchtendrot, 80–100 cm, August/September. T	3
– 'Starfire', Bl leuchtendrot, 80–100 cm, Aug./Sept. T	3
– 'Sternhimmel', Bl lavendelblau mit weißer Mitte, 80–100 cm, Juli/August T	3
– 'Vintage Wine', Bl purpurrot, großblumig, 70–80 cm, Juli/August. T	3
– 'Violetta Gloriosa', Bl lilaweiß, großdoldig, 80–100 cm, August/September T	3
– 'W. Kesselring', Bl purpurviolett mit weißer Mitte, 60–80 cm, Juli T	3
– 'Württembergia', Bl karminrosa mit hellem Auge, 70–80 cm, Juli T	3
Frühsommerphlox:	
x arendsii hort. 'Anja', (G. A.), Neuheit 1966, Bl leuchtend purpurrot, 40–60 cm, Juni/August . T	5
-- 'Hilda' (G. A.), Bl hell-lavendel, rosa Auge, 40–60 cm, Juni/August T	5
– 'Susanne' (G. A.), Bl weiß mit roter Mitte, 40–60 cm, Juni/August T	5
maculata 'Alpha', (G. A.), Bl lilarosa rispig, 60– 80 cm, Juni/August T	4
Physalis - Lampionpflanze - Solanaceae - ○ ⊗ ✂	
Raschwachsende Zierstaude mit unscheinbaren weißlichen Blüten, dafür aber mit orangerot gefärbten, ballonartigen Kelchhüllen, die im Herbst gerne in Trockensträußen Ver- wendung finden.	
franchetii, Bl unscheinbar, orangerote Früchte im August/September, 60–80 cm	2
Physostegia – Etagerenerika – Labiatae – ○ ✂	
Wertvolle, spätblühende Schmuck- und Schnittstaude für sonnigen Standort die gerne in Heidegärten angepflanzt wird N.: Berg- und Kissenaster, Liatris, Rudbeckia.	
virginiana 'Bouquet Rose', Bl kräftigrosa, 60–80 cm, August/September T	3
– 'Summersnow', Bl weiß, 80–100 cm, Aug./Sept. T	3
Platycodon – Ballonglocke –	
Campanulaceae – ○	
Anspruchslose, wirkungsvolle Staude, mit ballonartigen Blü- tenknospen, die sich später zu großen sternförmigen Blüten entfalten. In Heidegärten und Polsterpflanzenflächen wer- den sie besonders gerne verwendet.	
N.: Artemisia, Oenothera, Salvia.	
grandiflorum 'Album', Bl weiß, 40–50 cm, Juli/August T	3
– 'Mariesii', Bl leuchtendblau, 40–50 cm, Juli/Aug. T	3
– 'Perlmutteruschale', Bl perlmutterschale, 50 cm, Juli/August T	3
Podophyllum – Maiapfel – Berberidaceae – ⊗	
Eigenartige Schattenpflanze mit dekorativem Laub, inter- essanten Blüten und auffallend großen, eiförmigen, roten Früchten im Herbst.	
N.: Helleborus, Gillenia, Lathyrus, Pulmonaria.	
emodi 'Majus', B im Austrieb braunrot gezeichnet, Bl hellrosa, 50–60 cm, Mai/Juni T	7



Phlox paniculata, Flammenblume
Platycodon mariesii grdfl., Ballonglocke
Primula acaulis 'Grandiflora', Kissenprimel

Polemonium – Himmelsleiter –**Polemoniaceae –** ○ ◐ ✕

Ein zierlich belaubter Frühjahrsblüher, der sich zur Beetbepflanzung in Verbindung mit Polsterstauden bestens eignet.

N.: Heuchera, Potentilla, Geum.

- grandiflorum 'Blue Pearl'**, Bl besonders schöne hellblaue Sorte, frühblühend, 50 cm, April/Mai . . . T 3
- x richardsonii**, B gefiedert, Bl himmelblau, 40 cm, Mai 3
- **'Album'**, B gefiedert, Bl weiß, 40 cm, Mai 3

Polygonatum – Salomonssiegel –**Liliaceae –** ◐ ◑

Eine wertvolle Wildstaude, mit zierlich gebogenen Stengeln und hängenden Blütenglocken, deren schwarze Früchte im Herbst nochmals angenehm auffallen.

N.: Farne, Hosta, Rodgersia.

- multiflorum**, Bl weiß, 40 – 50 cm, Mai/Juni 4

Potentilla – Fingerkraut – Rosaceae – ○

Niedrige Schmuckstaude zur vielseitigen Verwendung, in erster Linie in Verbindung mit Polsterstauden.

N.: Gypsophila, Nepeta, Salvia, Veronica.

- nepalensis 'Miss Willmott'**, B erdbeerartig, Bl rosa, 40 – 50 cm, Juli/August T 3
- atrosanguinea 'Gibsons Scarlet'**, B erdbeerartig, silbrig, Bl glühend rot, 30 – 40 cm, Juni/August . . . 4

Primula – Schlüsselblume, Primel –**Primulaceae –** ○ ◐ ✕

Eine der allgemein bekannten Gartenpflanzen, die sich durch ihre verschiedenartigen Formen vom zeitigen Frühling bis zum Sommer immer wieder in Erinnerung bringen.

Kissenprimeln:

Schon im zeitigen Frühjahr erfreut diese Form durch ihre üppig bunten Blütenkissen, die sich an kühlfeuchten Plätzen besonders gut entwickeln

N.: Hacquetia, Hepatica, Omphalodes.

- juliae**, B klein rundlich, Bl purpur mit gelbem Auge, 5 – 10 cm, März/April 2
- x pruhoniciana 'Perle von Bottrop'**, Bl purpurrot, großblumig, 10 cm, März/April 2
- **'Purpurkissen'**, (G. A.), Bl purpurrot, 10 cm, März/April 2
- acaulis hortorum 'Alba'**, Bl weiß, 10 cm, März/April T 1
- **'Coerulea'**, Bl blau, 10 cm, März/April T 1
- **'Lutea'**, Bl gelb, 10 cm, März/April T 1
- **'Rubra'**, Bl rot, 10 cm, März/April T 1
- **'Prachtmischung'**, Bl reiches Farbenspiel, 10 cm, März/April T 1

Doldenprimeln:



Diese bringen mit ihren gestielten Blüten eine gleich gute Wirkung.

- elatio 'Grandiflora crescenda'**, großblumig, Prachtmischung, Bl reiches Farbenspiel, 15 – 20 cm, April/Mai T 1
- **'Rubra'**, Bl rot, 15 – 20 cm, April/Mai T 1
- **'Vierländer Gold'**, Bl goldgelb, großblumig, 15 – 20 cm, April/Mai T 2
- polyneura (veitchii)**, Bl purpurrosa, B behaart, breit und gezackt. Wildcharakter, 25 cm, Mai/Juni T 2
- x pubescens**, (Gartenaurekel), B lederig, Bl reiches Farbenspiel, 15 – 20 cm, April/Mai T 2
- rosea 'Gigas'**, (Rosenprimel, liebt feuchtsumpfigen Standort), Bl leuchtend/karminrosa, 15 – 20 cm, April T 2

Ballprimeln:


Mit ihren kugeligen Blütenköpfen sind sie in der Familie der Primeln nicht zu entbehren.

- denticulata 'Grandiflora Alba'**, (G. A.), Bl weiß, 20 – 30 cm, April/Mai T 2
- **'Grandiflora Ronsdorfer Hybriden'**, (G. A.), Bl lila und rosa Farbtöne, 20 – 30 cm, April/Mai . . . T 2
- **'Grandiflora Juno'**, (G. A.), Bl helllila, großblumig, 20 – 30 cm, April/Mai 3
- **'Rubin'**, Bl Blütendolden in karminroten Tönen . . . T 2



Primula denticulata, Ballprimel
Primula bulleesiana, Etagenprimel
Primula sikkimensis, Glockenprimel

	Preisgruppe
Primula - Fortsetzung	
Etagenprimeln: Erst im Juni bringt diese Gruppe ihre, in Etagen angeordneten Blütenstände zur Entfaltung. In feuchten, sumpfigen Lagen gedeihen sie besonders gut.	
bulleesiana , Bl Mischung in aparten Pastellfarben, 30 – 50 cm, Juni/Juli T	2
bulleyana , Bl orange, 30 – 50 cm, Juni/Juli . . . T	2
japonica 'Millers Crimson' , Bl intensivrot, 50–60 cm, Mai/Juni T	2
Glockenprimeln: An feuchten, halbschattigen Plätzen erfreut diese Art mit ihren großen, glockigen Blütenständen und beschließt den Blütenflor der großen Primelfamilie.	
florindae , Bl gelb, duftend, 40–80 cm, Juli/Aug. . T	2
sikkimensis , Bl schwefelgelb, 30 – 40 cm, Juni/Juli	2
Pulmonaria – Lungenkraut –	
Boraginaceae – ☉ ☉	
Anspruchslose Waldstaude für nicht zu trockene Böden.	
N.: Brunnera, Convallaria, Hosta.	
angustifolia 'Azurea' , Bl enzianblau, 20 – 30 cm, März/April T	3
hybrida 'Munstead Blue' , Bl leuchtendblau, 30 cm, April/Mai T	3
officinalis , Bl rotblau, 20–30 cm, März/April . . T	2
saccharata 'Mrs. Moon' , B silbrig gefleckt, Bl rot, 20 – 30 cm, April/Mai T	3
Ranunculus – Hahnenfuß –	
Ranunculaceae – ○ ☉	
Eine typische Wiesenpflanze, die sich gerne an Teichrändern verwenden läßt.	
N.: Filipendula, Myosotis, Thalictrum, Trollius.	
acer 'Multiplex' , Bl goldgelb, dichtgefüllt, 60 – 80 cm, Juni	2
Rodgersia – Schaublattspiere –	
Saxifragaceae – ☉	
Hervorragende Schmuck- und Solitärstaude mit auffallend bizarren Blütenständen und aparter Färbung der jungen Blätter, zur Verwendung unter Baum- und Gehölzgruppen.	
N.: Aruncus, Astilben, Digitalis, Ligularia.	
pinnata 'Hybriden' , B gefiedert, Bl cremeweiß, 80–100 cm, Juni/Juli	8
purdomii , B im Austrieb rötlichbraun, Bl weiß, 80 – 100 cm, Juni/Juli	8
sambucifolia , B holunderblättrig, Bl weiß, Juni/Juli .	8
tabularis , (Astilboides tabularis), B schildförmig, Bl weiß, 80 – 100 cm, Juni/Juli	8
Rudbeckia – Sonnenhut – Compositae – ○ ✕	
Wohl eine der unentbehrlichsten Sommer- und Herbststauden, die überall dort Verwendung finden können, wo es nicht zu dunkel ist.	
N.: Herbstastern, Phlox, Veronica longifolia.	
fulgida 'Goldsturm' , Bl orangegelb mit schwarzem Knopf, 60 – 80 cm, August/Oktober T	3
laciniata 'Goldquelle' , Bl gelb, gefüllt, 60 – 80 cm, Juli/September	4
nitida 'Herbstsonne' , Bl gelb, 150 – 200 cm, August/September	5
purpurea 'Hybride' , Bl purpur, 100 – 120 cm, Juli/September T	4
Salvia – Salbei – Labiatae – ○	
Vielseitig verwendbare, wirkungsvolle Schmuckstaude für trockene sonnige Lagen.	
N.: Achillea, Eriophyllum, Heuchera, Oenothera.	
x superba 'Mainacht' , Bl nachtblau, leuchtend, 40 cm, Juli/August T	5
– 'Ostfriesland' , Bl dunkelviolett, 50 cm, Juni/September	3



Pulmonaria saccharata, Lungenkraut
Rodgersia purdomii, Schaublattspiere
Rudbeckia ful. Goldsturm, Sonnenhut

	Preisgruppe
Scabiosa – Witwenblume – Dipsacaceae – ○ ✕ Eine anmutige Erscheinung unter den Sommerstauden, mit äußerst haltbaren Schnittblumen. N.: Coreopsis, Phlox, Rudbeckia. caucasica 'Clive Greaves' , Bl reinblau, 80–100 cm, Juni/September 5 – 'Miss E. Willmott' , Bl reinweiß, 80 – 100 cm, Juni/September 5 – 'Nachtfalter' , Bl dunkelviolett, 80 – 100 cm, Juni/September 5	
Sedum – Fetthenne – Crassulaceae – ○ Als altbekannte Gartenpflanze trägt sie mit ihren karmin- und rostroten Blüten wesentlich zur Bereicherung des herbstlichen Gartenbildes bei. Bienenweide! N.: Bergenia, niedrige Herbstastern, Oenothera. spectabile 'Carmen' , B fleischig, Bl dunkelrot, 30 – 40 cm, August/September. T 3 telephium 'Herbstfreude' , (G. A.), B fleischig, Bl rostrot, 40 – 60 cm, September/Okttober. Eigene Züchtung! Wertzeugnis 1971 der Deutschen Gartenbaugesellschaft e. V. für hervorragende Pflanzenneueheit! T 3	
Solidago – Goldrute – Compositae – ○ ◐ Wenn auch als 'Trümmerpflanze' in Verruf gekommen, ist es ein Versäumnis, auf diese reizvollen Herbststauden zu verzichten. N.: Gartenchrysanthemen, Herbstastern, Helenium. Hybride 'Strahlenkrone' , Bl goldgelb, flache Blütenstände, 60 – 70 cm, August/September 4	
Stachys – Ziest – Labiatae – ○ Als Schmuckstaude, wie auch zur Flächenpflanzung lassen sich die Vertreter dieser Staudenart verwenden. N.: Nepeta, Polygonum affine, Ajuga. grandiflora 'Superba' , Bl purpurrosa, 40 – 60 cm, Juni/Juli 3 lanata , B silberwollig, Bl rosa, 30 – 40 cm, Juni/Juli 2	
Tellima – Falsche Alraunwurzel – Saxifragaceae – ◐ ◑ Anspruchslose Blattpflanze mit unscheinbaren Blüten, die selbst noch im tiefsten Schatten den Boden begrünt. N.: Asperula, Lamium, Pachysandra, Vinca. grandiflora , B herzförmig, immergrün, 40 – 50 cm, Mai/Juni 1	
Thalictrum – Wiesenraute – Ranunculaceae – ○ ◐ Eine auf feuchten Wiesen beheimatete Wildstaude gedeiht an nicht zu trockenen, sonnigen bis halbschattigen Plätzen, insbesondere kommt sie in Wassernähe zur vollen Geltung. N.: Filipendula, Iris sibirica, Trollius. aquilegifolium , B akeleiartig, blaugrün, Bl purpur-lila, 100 – 120 cm, Juni. 4 dipterocarpum , B fein zerteilt, Bl purpur-lila, mit weißer Mitte, 100 – 120 cm, Juli/August T 4	
Tradescantia – Dreimasterblume – Commelinaceae – ○ ◐ Langblühende Schmuckstaude zur vielseitigen Verwendung, besonders wirkungsvoll in Wassernähe. N.: Hemerocallis, Iris, Kniphofia, Lythrum. x andersoniana 'Karminglut' , Bl schönes Leuchtendrot, 50 cm, Juni/August 4 – 'J. C. Weguelin' , Bl hellblau, 50 cm, Juni/August 4 – 'Zwaanenburg Blue' , Bl mittelblau, 50 cm, Juni/August 4	
Trillium – Dreiblatt – Liliaceae – ◐ ◑ Aparte Waldpflanze, die an Schattenstellen ihre einzigartigen, dreiteiligen Blütentrichter entfaltet. N.: Hepatica, Frühjahrsprimeln, Saxifraga umbrosa. grandiflorum , B dreiteilig, Bl weiß mit rosa Schein, 20 cm, Mai T 7	



Rudbeckia purpurea, Sonnenhut

Sedum telephium 'Herbstfreude' (G. A.), Wertzeugnis 1972


Thalictrum aquilegifolium, Wiesenraute

	Preisgruppe
Trollius – Trollblume – Ranunculaceae – ○ ● ✂ Die bekannte Goldranunkel, die immer wieder in Wassernähe verwendet wird, aber bei genügender Bodenfeuchtigkeit auch als Beetstaude, insbesondere zur Schnittblumengewinnung geeignet ist. N.: Myosotis palustris, Polemonium, Ranunculus. chinensis 'Golden Queen' , Bl gelb mit weitherausragenden orangefarbigen Honigblättern, 60–80 cm, Juni T 4 cultorum 'Helios' , Bl zitronengelb, 50–70 cm, Mai T 5 – 'Orange Globe' , Bl orangegelb, 80 cm, Mai . T 5 europaeus 'Superbus' , Bl hellgelb, 50 – 70 cm, Mai T 4	
Veratrum – Germer – Liliaceae ○ ● ✂ Vorzügliche Solitär- und Gruppenstaude – nigrum 'Schwarzer Germer' , Bl schlanke schwarzpurpurne Blütenrispen, dekorativer Samenstand, B spiralig angeordnet, 120 – 150 cm, Juli/August 10	
Verbascum – Königskerze – Scrophulariaceae – ○ ● Wertvolle und dekorative Schmuckstaude zur Einzelstellung und Gruppenpflanzung vor Gehölzgruppen und in flächiger Staudenpflanzung. N.: Digitalis, Lupinen, Monarda, Heidepflanzen. bombyciferum 'Polar sommer' , Bl hellgelb, dekorative weißwollige Blütenkerzen und Blattrosetten, 150 cm, Juni/August T 4 longifolium var. pannosum , B weißfilzig, Bl gelb, 120 – 150 cm, Juni T 4 nigrum , Bl goldgelb, lila gezeichnet, 120 – 150 cm, Juli/August T 4	
Veronica – Ehrenpreis – Scrophulariaceae – ○ Verschiedenartige, gut verwendbare Sommerstaude für sonnigen Standort. N.: Coreopsis, Helenium, Kentranthus. longifolia 'Blauriesin' , Bl leuchtendblau, 60 – 80 cm, Juli/Oktob er T 4 spicata 'Erika' , B graugrün, Bl rosa, 30 – 40 cm, Juni/Juli T 2	
Yucca – Palmlilie – Liliaceae – ○ Ausgesprochene Solitärstaude, die mit ihrem blaugrünen Blattwerk und hohen Blütenschäften beeindruckt, für sonnigen, trockenen Standort. filamentosa , B graugrün, Bl cremeweiß, glockig, 100 – 150 cm, Juli/September T ab 9	

Niedrige Stauden

für Steingarten, Trockenmauer und Bodenbegrünung

Aceana – Stachelnüsschen – Rosaceae – ○ ● Willig wachsende, immergrüne Bodendecke für sonnige bis halbschattige Plätze, insbesondere in Heidegärten. N.: Dianthus, Lotus, Gypsophila repens, Thymus. buchananii , B silbriggrün, Bl unscheinbar, 5 cm, April/Mai T 1 microphylla , B braungrün, Bl unscheinbar, rotbraune Früchte, 5 – 10 cm. April/Mai T 1 – 'Kupferteppich' , Bl unauffällig, B braungrün, 5 cm, Mai T 1	
Acantholimon – Igelpolster – Plumbaginaceae – ○ Wertvolle, spätblühende Staude, die mit ihren stachelig, dichten Polstern an sonnigen Standorten gedeiht. N.: Linum, Carlina, Aethionema. glumaceum , B stachelig, Bl rosarot, 10 – 15 cm, Juli/August T 5	





Tradescantia andersoniana, Dreimasterblume

Trollius hybr., Trollblume

Trollius chinensis, Trollblume

	Preisgruppe
Achillea – Schafgarbe – Compositae – ○ Anspruchslose Polsterstaude mit aromatisch duftender, meist silbergrauer Belaubung. N.: Geranium, Helianthemum, Lavandula. ageratifolia var. serbica , Bl silbergrau, Bl weiß, 20 cm, Mai/Juli T 2 tomentosa , B grauwollig, Bl gelb, 20 – 30 cm, Juni/Juli T 1	
Aethionema – Steintäschel – Cruciferae – ○ Ausgesprochene Geröllpflanze für trockene, sonnige Plätze, wo für guten Wasserabzug gesorgt ist. N.: Anacyclus, Armeria caespitosa, Draba, Alyssum spinosum. coridifolium grdf. , B blaugrün, Bl rosa, 15 – 20 cm, Mai/Juni T 3	
Ajuga – Günsel – Labiatae – ○ ◐ ◑ Oft verwendeter, schnellwachsender Bodendecker für alle Lagen mit genügender Feuchtigkeit. N.: Cerastium, Campanula poscharskyana, Corydalis. reptans 'Atropurpurea' , B braunrot, Bl blau, 15 – 20 cm, Mai/Juni T 1	
Alyssum – Steinkraut – Cruciferae – ○ Eine Polsterpflanze für sonnigen Standort, die mit ihren leuchtend gelben Blüten nicht zu entbehren ist. N.: Aubrieta, Iberis, Phlox subulata. saxatile 'Citrinum' , B graugrün, Bl zitronengelb, 20 – 30 cm, April/Mai T 2 – 'Compactum' , B graugrün, Bl goldgelb, 20–30 cm, April/Mai T 2 – 'Plenum' , B graugrün, Bl goldgelb, gefüllt, 20 cm, Mai/Juni T 5	
Anacyclus – Zwergmargerite – Compositae – ○ Flachwachsende, zierlich belaubte Kleinstauke zur Verwendung an sonnigen Stellen. N.: Anemone pulsatilla, Hypericum polyphyllum, Potentilla. depressus B graugrün, gefiedert, Bl weiß, unterseitig rot, 5 – 10 cm, Mai/Juni T 2	
Anaphalis – Silberimmortelle – Compositae – ○ Silbergrau belaubte Staude mit strohblumenartigen Blüten, die noch im dürrtigitsten Boden verwendet werden kann. N.: Oenothera missouriensis, Polygonum, Veronica. triplinervis , B silbrig, Bl weiß, 20 – 25 cm, Juni/September T 3	
Androsace – Mannschild – Primulaceae – ○ ◐ Silberrosettige Gebirgspflanze, die mit ihren Ausläufern dichte Horste bildet. N.: Aquilegia alpina, Dryas, Phyteuma. sarmentosa , B silbrig, behaart, Bl rosa, 10 cm, Mai/Juni T 3	
Anemone – Windröschen – Ranunculaceae – ○ ◐ Dankbare Waldstauden mit anmutigen Blüten, die sich an leicht beschatteten, nicht zu trockenen Plätzen verwenden lassen. N.: Anemone japonica, Primula, Tiarella. sylvestris , Bl weiß, 30 – 40 cm, Mai T 3	
Anemone – Küchenschelle – Ranunculaceae – ○ Eine beliebte Frühlingsstaude zur vielseitigen Verwendung. N.: Carlina, Dryas, Iberis, Prunella. pulsatilla , B feinfiedrig, Bl violett, mit wolligen Hüllblättern, bärtige Samenstände, 15 – 20 cm, April/Mai T 3	
Antennaria – Katzenpfötchen – Compositae – ○ Diese silbergraue, teppichbildende Polsterstaude gedeiht noch auf trockensten Böden und ist besonders zur Belebung von Heidegärten geeignet. N.: Campanula, Ajuga, Sedum, Veronica. dioica 'Rubra' , B silbergrau, Bl rot, 15 – 20 cm, Mai T 2 – 'Tomentosa' , B silbrig, Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai T 2	



Veronica spicata, Ehrenpreis
Anemone pulsatilla, Küchenschelle
Armeria caespitosa, Berggrasnelke

	Preisgruppe
Anthemis – Bergmargeriten – Compositae – ○ Silbergrau belaubte, zierliche Gebirgssauden erfreuen im Frühsommer mit einer Fülle von Margeritenblumen. N.: Armeria, Veronica, Viola cornuta. biebersteiniana , B silbrig, filigran, Bl goldgelb, 15 – 20 cm, Mai/Juni T	2
Aquilegia – Akelei – Ranunculaceae – ○ ● Allgemein bekannte Akelei, deren niedrigbleibende Arten in Verbindung mit Polsterpflanzen gut zur Wirkung kommen. N.: Eriophyllum, Geum, Potentilla. alpina 'Hortorum' , Bl leuchtendblau, 30 – 40 cm, Mai/Juni T helenae , Bl dunkelblau mit weiß, 20 cm, Mai . . . T	3 3
Arabis – Gänsekresse – Cruciferae – ○ Überall bekannte, wüchsige Polsterstaude für Steingarten und Trockenmauern. N.: Alyssum, Aubrieta, Iberis, Phlox subulata. caucasica 'Plena' , Bl weiß gefüllt, 20-25 cm, April/Mai. T grandiflora 'Superba' , Bl. großblumig, weiß, 15-20 cm, April/Mai T – 'Monte Rosa' , Bl dunkelrosa, 10-15 cm, April/Mai T procurrens , B immergrün, guter Bodendecker, Bl weiß, 10 – 20 cm, April/Mai T	2 1 2 1
Armeria – Grasnelke – Plumbaginaceae – ○ Grasnelken sind meist auf sandigen Böden beheimatet und sollten an entsprechend trockenen Plätzen verwendet werden. N.: Dianthus deltoides, Geranium, Gypsophila, Nepeta. caespitosa , B grasartig, Bl rosa, 5 cm, April/Mai . . T maritima 'Alba' , Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai/Juni . . T – 'Düsseldorfer Stolz' , Bl leuchtend rosa, 20-30 cm Juni/August T – 'Rosea Compacta' , Bl karminrosa, 15 – 20 cm, Mai/Juni T	3 2 2 1
Artemisia – Edelraute – Compositae – ○ Mehr durch ihre silbergraue Belaubung, als durch ihre unscheinbare Blüte wirkende Staude für sonnigen Standort. N.: Campanula, Liatris, Sedum cauticolum, Silene schafta. schmidtii 'Nana' , B silbrig, fein geteilt, Bl unscheinbar, Juli/August, 20 – 25 cm T	3
Asarum – Haselwurz – Aristolochiaceae – ● ● N.: Viola odorata, Cyclamen, Convallaria, Saxifraga umbr. europaeum , B glänzend, lederartig dunkelgrün, bodendeckend, 10 cm T	2
Asperula – Waldmeister – Rubiaceae – ● ● Nicht nur wegen der zarten Blätter, die in der Maibowle verwendet werden, ist der Waldmeister allgemein bekannt, sondern auch als guter Bodendecker, der ganze Flächen unter Gehölzen erobert und dadurch kein unerwünschtes Unkraut aufkommen läßt. N.: Hosta, Lamium, Polygonatum, Vinca. odorata , B quirlförmig, Bl weiß, 10 – 20 cm, Mai . . T	1
Aster – Frühlingsaster – Compositae ○ ✂ Schon im Frühjahr reichblühende Schnittstaude aus der großen Familie der Asten zur Anpflanzung im Steingarten und Staudenbeet. N.: niedrige Achillea, Iberis, Saxifraga arendsii alpinus (Alpenaster) 'Dunkle Schöne' , Bl blau, 15 – 20 cm, Mai/Juni T alpinus 'Albus' , Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai/Juni. . . T	2 2
Astilbe – Zwergspiere – Saxifragaceae – ○ Ähnlich den hochwachsenden Astilben lieben auch die niedrigen Arten einen feuchten, halbschattigen Standort. N.: Androsace, Phyteuma, Prunella, Tiarella. chinensis pumila , Bl lilarosa, 20 – 30 cm, treibt Ausläufer und ist als Bodendecker zu verwenden, August/September. T x crispa 'Liliput' , (G. A.), B kraus, dunkelgrün, Bl lachsrosa, 15 cm, Juli T – 'Perkeo' , (G. A.), B kraus, dunkelgrün, Bl dunkelrosa, 15 cm, Juli T	3 5 5



Asarum europaeum, Haselwurz

Astilbe crispa 'Liliput' (G. A.), Zwergspiere

Aubrieta Hybride, Blaukissen

Aubrieta – Blaukissen – Cruciferae – ○

Längst zu einem Begriff gewordene Polsterpflanze, die an sonnigen, wie auch etwas absonnigen Plätzen wahre Blütenwogen entfaltet, insbesondere auch für Trockenmauern geeignet.

N.: Alyssum, Iberis, Phlox subulata, Saxifraga.

Hybride 'Dr. Mules' , Bl dunkelveilchenblau, 10 cm, April/Mai T	2
– 'Neuling' , Bl hellavendelblau, 10 cm, April/Mai T	2
– 'Schloß Eckberg' , Bl dunkellavendelblau, 10 cm, April/Mai T	2
– 'Vesuv' , (G. A.), Bl karminrot, 10 cm, April/Mai T	2

Campanula – Glockenblume –**Campanulaceae – ○ ◐**

Nach dem Hochflor der Frühjahrsblüher entfalten die Glockenblumen ihre verschiedenartigen Blüten, wobei sie sonnige Plätze, insbesond. an Trockenmauern bevorzugen.

N.: Galium ochroleucum, Linum, Inula.

carpatica 'Blaue Clips' , Bl himmelblau, 20 cm Juni/Juli T	2
– 'Karpatenkrone' , Bl silberblau, großblumig, 20 – 25 cm, Juni/Juli T	3
– 'Weiße Clips' , Bl strahlend weiß, 20 cm Juni/Juli T	2
– var. turbinata , Bl dunkelviolet, 15 – 20 cm, Juli/August T	4
garganica 'Erinus Major' , Bl blau, sternförmig, 10 cm, Juli/August T	2
portenschlagiana , Bl dunkellila, aufrechte Glöckchen, 10 cm, Juni/Juli T	2
– 'Birch Hybrid' , Bl dunkellila, großblumig, 10 – 15 cm Juni/Juli T	4
poscharskyana , Bl lila, sternförmig, starkwachsend, 15 cm, Juni/August T	2
– 'Stella' , (G. A.), Bl dunkellila, sternförmig, 15 cm, Juni/September T	3
pusilla , Bl blau, kleine, hängende Glöckchen, 10 cm, Juni/Juli T	2
– 'Alba' , Bl weiß, kleine hängende Glöckchen, 10 cm, Juni/Juli T	2

Carlina – Silberdistel – Compositae – ○

Die Silber- oder Wetterdistel sollte ihrem natürlichen Vorkommen gemäß – einzeln oder in Gruppen – in Heide- oder Polsterstaudenpflanzungen angesiedelt werden.

N.: Campanula, Festuca, Liatris, Wildnelken.

acanthifolia , Golddistel, B flach auf dem Boden liegend, graugrün, spitzstachelig gezackt, Bl strohgelb, sehr groß, 5 cm, besonders für Alpinum, Tröge, Mühlräder, Juli/August T	6
acaulis , B bizarr, stachelig, Bl silbrigweiß, 10 cm, Juli/August T	4
'Caulescens' , B bizarr, stachelig, Bl silberweiß, 20 – 30 cm, gestielt, Juli/August T	4

Cerastium – Hornkraut – Caryophyllaceae – ○

Anspruchslose, silberlaubige Polsterpflanze mit weißen Sternblüten, die zur blütenarmen Zeit eine willkommene Abwechslung bringt.

N.: Campanula poscharskyana, Carlina, Polygonum affine.

tomentosum var. columnae , B silberweiß, Bl weiß, 15 cm, Juni T	2
--	---

Chiastophyllum – Goldtröpfchen –**Crassulaceae – ○ ◐**

Wertvolle Kleinstauda mit kleinen Blütenglöckchen für sonnigen bis halbschattigen Standort.

N.: Campanula, Gentiana lagodechiana, Viola cornuta.

oppositifolium , B rund, fleischig, Bl goldgelb, 15 cm, Juni/Juli T	2
--	---

Corydalis – Lerchensporn –**Papaveraceae – ○ ◐ ◑**

Ein wirklich überall gedeihender Dauerblüher, der selbst noch an dunkelsten Stellen mit seinen Blüten erfreut.

N.: Asperula, Brunnera, Campanula poscharskyana, Vinca.

lutea , B zierlich, Bl gelb, 20 – 30 cm, Mai/Oktob. T	2
--	---




Campanula carpatica var. 'Turbinata', Krieselglockenblume

Campanula poscharskyana 'Stella' (G. A.), Hängepolsterglocke

Campanula pusilla, Alpenglockenblume

	Preisgruppe
Cotula – Fiederpolster – Compositae – ○ ● Raschwachsende, moosartige Teppichpflanze für sonnigen bis halbschattigen, nicht zu trockenen Standort. N.: <i>Linaria pallida</i> , <i>Moehringia</i> , <i>Omphalodes</i> . squalida , B gefiedert, braungrün, Bl unscheinb., 5 cm T	1
Cyclamen – Alpenveilchen – Primulaceae – ● Reizende Wildstaude für humose, nicht zu feuchte Böden in leicht beschatteter Lage. N.: <i>Anemone sylvestris</i> , <i>Soldanella</i> , <i>Tiarella</i> . coum 'Hiemale', Bl karminrosa, 10 cm, März . . . T – 'Album', Bl weiß mit rosa Schein, 10 cm, März T europaeum , B weiß gezeichnet, Bl rosarot, duftend, 15 cm, August/September T neapolitanum , B efeuartig, weiß gezeichnet, Bl rosa, vor Blattaustrieb, 15 cm, August/September T – 'Album', B efeuartig, weiß gezeichnet, Bl weiß, vor Blattaustrieb, 15 cm, August/September. . . T	6 6 6 6 6
Dianthus – Nelke – Cariophyllaceae – ○ Bekannter Sommerblüher für trockene Sonnenlagen. N.: <i>Inula ensifolia</i> , <i>Lavandula</i> , <i>Satureja</i> . deltoides (Heidenelke) 'Brillant', B kleinblättrig, grün, Bl leuchtendrot, 20 cm Juni/Juli T caesius (Felsenelke) 'Nordstjernen', B blaugrün, Bl rosa, 15–20 cm, Mai/Juni T – 'Rotkäppchen', B graugrün, Bl dunkelrot, halbgefüllt, 15–20 cm, Mai/September T plumarius (Federnelke) 'Diamant', B blaugrün, Bl weiß, gefüllt, 20–30 cm, Mai/Juni T – 'Maggi', Bl gefüllt rosa, dunkel geaugt, Wuchs gedrungen, 15 cm, Juni/August T – 'Saxonia', B blaugrün, Bl purpurrot, gefüllt, 20–30 cm, Mai/Juni T	1 2 2 3 4 3
Dicentra – Herzblume – Papaveraceae – ● Niedrige Form des bekannten 'Tränenden Herzens', in halbschattiger Lage als Bodendecker verwendbar. N.: <i>Corydalis</i> , <i>Epimedium</i> , <i>Omphalodes</i> , <i>Lysimachia nummularia</i> . formosa , B farnartig, Bl dunkelrosa, 30 cm, Mai/Juli .	3
Draba – Hungerblümchen – Cruciferae – ○ Wertvolle Polsterstaude, die mit ihrer wintergrünen Belaubung gerne in Trockenmauern Verwendung findet. N.: <i>Globularia</i> , <i>Iberis saxatilis</i> , <i>Sempervivum</i> . bruniifolia , B moosart., Bl gelb, 5–10 cm, April/Mai, T	2
Dryas – Silberwurz – Rosaceae – ○ Wertvolles, teppichbildendes Zwerggehölz mit anemoneartigen Blüten und langbehaarten Samenständen für trockene und sonnige Lagen. N.: <i>Anemone pulsatilla</i> , <i>Potentilla ternata</i> , <i>Silene</i> . octopetala var. lanata , B lederig, grau behaart, Bl weiß, 10 cm, Mai/September T x suendermannii , B lederig, Bl cremeweiß, 15 cm, Mai/September T	4 4
Edraianthus – Büschelglocke – Campanulaceae – ○ Reichblühende Zwergstaude mit nadelartiger Belaubung zur Verwendung in Trockenmauern und Steingärten. N.: <i>Draba</i> , <i>Campanula portenschlagiana</i> , <i>Sempervivum</i> , pumilio , Bl lila, B graugrün, 5 cm, Mai/Juni T	5
Epimedium – Elfenblume – Berberidaceae – ● ● Eine der reizvollsten Schattenstauden mit zierlichem Laub und kleinen Blüten, die an Orchideen erinnern. N.: niedrige Farne, <i>Dicentra formosa</i> , <i>Wulfenia</i> . grandiflora 'Normale', B im Austrieb bräunlich, Bl lila, 20 cm, April/Mai T pinnatum 'Elegans', Bl schwefelgelb, 20–30 cm, April/Mai T x rubrum , B im Austrieb rötlich, Bl karminrot, 20–30 cm, April/Mai T x youngianum 'Niveum', B im Austrieb bräunlich, Bl weiß, 20 cm, April/Mai T	4 4 4 4





Carlina acaulis caulescens, Silberdistel
Chiasophyllum oppositifolium, Goldtröpfchen
Cyclamen neapolitanum, Herbst-Wildalpenveilchen

○ = volle Sonne

◐ = Halbschatten

◑ = Schatten

	Preisgruppe
Erinus – Leberbalsam – Scrophulariaceae – ○ ◐ Niedliche, reichblühende Felsenpflanze, die sich besonders in Trockenmauern wohlfühlt. N.: <i>Draba</i> , <i>Edraianthus</i> , <i>Sempervivum</i> . alpinus 'Dr. Hähnle' , B dunkelgrüne Rosetten, Bl leuchtendrot, 10 cm, Mai/Juni T	2
Eriogonum – Wollknöterich – Polygonaceae – ○ Noch wenig verwendete halbholzige Polsterpflanze, deren zartgelbe Blüten erst im Spätsommer erscheinen. N.: <i>Gypsophila</i> , <i>Dryas suendermannii</i> , <i>Nepeta</i> . umbellatum , B graugrün, Bl hellgelb, 25 cm, Juli/Sept. T	3
Euphorbia – Wolfsmilch – Euphorbiaceae – ○ Geröllpflanze mit walzenförmigen, blaugrün belaubten Trieben für sonnigen Standort, wo für guten Wasserabzug gesorgt sein sollte. N.: <i>Geranium</i> , <i>Gypsophila repens</i> , <i>Hypericum polyphyllum</i> . myrsinites , B blaugrün, Bl grünlichgelb, 20 cm, April/Mai T	4
Gentiana – Enzian – Gentianaceae – ○ ◐ Eine der bekanntesten Alpenpflanzen, die dort in Almwiesen – durch Grashalme leicht beschattet – gedeihen. Gibt man ihnen ähnliche Lebensbedingungen, so erfreuen sie auch im Hausgarten durch ihre ausdrucksvollen Blüten. N.: <i>Chiastophyllum</i> , <i>Potentilla ternata</i> , <i>Primula auricula</i> . acaulis , Bl leuchtendblau, 10 cm, Mai T septemfida var. lagodechiana , Bl leuchtendblau, 15–20 cm, Juli/September. T sino-ornata , Bl blau, 15 cm, September/Okttober . T	5 4 5
Geranium – Storchschnabel – Geraniaceae – ○ Sonnenliebende Kleinstauden ohne besondere Ansprüche. N.: <i>Aethionema</i> , <i>Dianthus</i> , <i>Dryas</i> , <i>Potentilla ternata</i> . dalmaticum , B orangerote Herbstfärbung, Bl reinrosa, 10 cm, Juni/Juli T subcaulescens 'Purpureum' (G. A.) , Bl purpurrot, 15 – 20 cm, Juni/Juli T – 'Splendens', (G. A.) , Bl leuchtendkarminrot, 15 – 20 cm, Juni/Juli T	4 5 5
Globularia – Kugelblume – Globulariaceae – ○ N.: <i>Achillea</i> , <i>Dianthus</i> , <i>Draba</i> , <i>Iberis</i> . cordifolia , Bl blaue Köpfchen, B fest, lederartig, 10 cm, Mai/Juni T	2
Gypsophila – Schleierkraut – Caryophyllaceae – ○ Unentbehrliche Polsterpflanze, die zur Auflockerung von Staudengruppen und Heidepartien wesentlich beiträgt. N.: <i>Achillea tomentosa</i> , <i>Helianthemum</i> , <i>Oenothera missouriensis</i> . x monstrosa , Bl weiß, 30–40 cm, Juni/Juli . . T paniculata 'Rosenschleier' , Bl zartrosa, gefüllt, 20 – 30 cm, Juni/August T repens , Bl weiß, 10 cm, Mai/Juli T – 'Rosa Schönheit' , vorzügliche Neuheit, Bl reichblühend, groß, rosa, 10–15 cm, Mai/Juli T	2 2 1 2
Haberlea – Haberlee – Gesneriaceae – ◐ Seltene Gebirgspflanze, die nur in absonnigen Mauerfugen gut gedeiht. N.: <i>Androsace</i> , <i>Soldanella</i> , <i>Moehringia</i> . rhodopensis , B dunkelgrüne Rosetten, wintergrün, Bl lilablau mit gelbem Schlund, 10 cm, Mai/Juni . T	7
Hacquetia – Schaftdolde – Umbelliferae – ◐ Zu wenig verwendeter Frühjahrsblüher, der an halbschattiger bis schattiger Stelle gut gedeiht. N.: <i>Helleborus</i> , <i>Hepatica</i> , <i>Kissenprimel</i> , <i>Pulmonaria</i> . epipactis , B hellgrün, Bl grüngelb, 10 – 15 cm, April/Mai T	4



Dryas oct. lanata, Silberwurz

Euphorbia myrsinites, Walzenwolfsmilch

Hacquetia epipactis, Schaftdolde

	Preisgruppe
Helianthemum – Sonnenröschen – Cistaceae – ○ Kleine Halbsträucher, die in Verbindung mit Heidepflanzen und Polsterstauden an sonnigem Standort verwendet werden. N.: Aubrieta, Festuca, Lavandula, Lotus. hybridum 'Eisbär', B silbergrau, Bl reinweiß, 15 – 20 cm, Juni/August T 2 – 'Feuerbrand', Bl einfach rot, 15–20 cm, Juli/Aug. T 2 – 'Golden Queen', Bl gelb, 15 – 20 cm, Juni/Juli T 2 – 'Gelbe Perle', Bl gelb, gefüllt, 15–20 cm, Juni/Aug. T 2 – 'Lawrenson's Pink', Bl einfach, rosa mit orange Mitte, 15–20 cm, Juni/August T 2 – 'Rubin', Bl rot, gefüllt, 15 – 20 cm, Juni/August . T 2 – 'Ruth', B graulaubig, Bl orangerot einfach, guter Wuchs, 15 – 20 cm, Juni/August. T 2 – 'Sterntaler', B dunkelgrün, Bl goldgelb, flachwachsend, Juni/August T 2	
Helichrysum – Strohblume – Compositae ○ ✂ Besonders für Heidegärten und Steingärten wertvoll durch die lange Blütezeit bis zum Herbst. N.: Eryngium, Nepeta, Salvia, Santolina, Festuca scop. hybrida 'Schwefellicht', Bl schwefel-goldgelb, reichblühend, remontierend, B grausilber, 30 cm, Juli/Oktobre T 2	
Heliosperma – Alpenleimkraut – Caryophyllaceae – ○ ● Zierliche, nelkenartige Felsenstaude zur Verwendung an trockenen Stellen im Steingarten und in Trockenmauern. N.: Dryas, Geranium dalmaticum, Potentilla ternata. alpestre, Bl weiß bis zartrosa, 15 – 20 cm, Juni/Juli T 2	
Hepatica – Leberblümchen – Ranunculaceae – ● ● Das in lichten Laubwäldern heimische Leberblümchen sollte unter ähnlichen Bedingungen angesiedelt werden. N.: Hacquetia, Asarum, Viola odorata. triloba, B dreiteilig, Bl hellblau, 10–15 cm, März/April T 2	
Herniaria – Bruchkraut – Caryophyllaceae – ○ Flachpolsternde Staude, die dichte, frischgrüne Teppiche bildet, zur Verwendung an sonnigen Plätzen in Heidegärten und in Plattenwegen. N.: Acaena, Draba, Dianthus, Thymus. serpyllifolia, B dunkelgrün, Bl unscheinbar, 2–5 cm T 1	
Hieracium – Habichtskraut – Compositae – ○ Anspruchslose Wildstaude, die an sonnigem Standort, insbesondere in Heidegärten gedeiht. N.: Geranium, Oenothera missouriensis, Polygonum affine. x rubrum, B grün, filzig, Bl orangerot, 20 – 30 cm, Juli/August T 2 villosum, B grau, filzig, Bl gelb, 25 – 30 cm, Juni/Juli T 2	
Hypericum – Johanniskraut – Hypericaceae – ○ ● Langblühender, viel verwendeter Bodendecker für sonnige bis halbschattige Lage mit großen gelben Blüten, aus denen die Staubfäden auffallend herausragen. N.: Gräser, Hosta, Veronica longifolia, Rhododendron calycinum, B immergrün, Bl goldgelb, 20 – 30 cm, Juni/September T 3 N.: Campanula, Carlina, Dianthus, Linum. polyphyllum, Kleinstauden für trockene, sonnige Plätze in Heide- u. Steingarten, wie auch in Trockenmauern. B feinlaubig, blaugrün, Bl gelb, 15 – 20 cm, Juni/Juli T 2	
Iberis – Schleifenblume – Cruciferae – ○ Unentbehrliche, wintergrüne Halbsträucher zur Verwendung in Staudengruppen, Steingarten und Trockenmauern. N.: Alyssum, Arabis, Aubrieta, Phlox subulata. saxatilis, Bl weiß, 10 cm, Trockenmauer, April/Mai, im Herbst nachblühend T 2 sempervirens, B dunkelgrün, Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai/Juni T 2 – 'Schneeflocke', B hellgrün, Bl weiß, großblumig, 15 – 20 cm, Mai/Juni T 2	




Gentiana acaulis, Enzian

Gentiana sept. lagodechiana, Sommerenzian

Gentiana sino-ornata, Herbstenzian

	Preisgruppe
Iberis – Fortsetzung	
– 'Weißer Zwerg' (G. A.), B kugelige Büsche, Bl weiß, 10 cm, April/Mai T	2
– 'Zwergschneeflocke', B zierlich, kleine Polster bildend, 15 cm, Bl reinweiß, April/Mai T	2
Inula – Alant – Compositae – ○	
Wertvoller Spätblüher für sonnigen, trockenen Standort.	
N.: <i>Gentiana lagodechiana</i> , <i>Sedum caucolicum robustum</i> , <i>Silene</i> .	
ensifolia 'Compacta' , B schmalblättrig, Bl gelb, 20 cm, Juli/September T	2
Iris – Zwergschwertlilie – Iridaceae – ○	
Eine niedrige Iris mit verhältnismäßig großen Blumen, die zur Auflockerung von Polsterstaudenpflanzungen beiträgt.	
N.: <i>Armeria</i> , <i>Oenothera missouriensis</i> , <i>Viola cornuta</i> .	
pumila 'Aurea' , Bl gelb, 10 – 20 cm, April/Mai	3
– 'Brassie', Bl goldgelb, reichblühend, 25 cm	3
– 'Cyanea', Bl dunkelviolet, 10 – 20 cm, April/Mai	3
Lamium – Goldnessel – Labiatae – ◐ ◑	
Starkwachsender, anspruchsloser Bodendecker zur Unterpflanzung von Gehölzen, wobei er Unkräuter vollkommen unterdrückt.	
N.: <i>Brunnera</i> , <i>Hosta</i> , <i>Waldsteinia</i> .	
galeobdolon 'Florentinum' , B silbrig gefleckt, Bl gelb, 20 – 25 cm, Mai/Juni T	1
Lavandula – Lavendel – Labiatae – ○	
Graulaubiger, aromatisch duftender Halbstrauch mit blauen Blütenähren, die häufig von Schmetterlingen besucht werden	
N.: <i>Inula</i> , <i>Liatris</i> , <i>Polygonum affine</i> .	
angustifolia 'Hidcote Blue' , Bl violettblau, 30 cm, Juli/August T	2
Leontopodium – Edelweiß – Compositae – ○	
Beliebte Alpenpflanze, die auch im Garten willig wächst und blüht, wenn sie einen trockenen, sonnigen und mageren Standort vorfindet.	
N.: <i>Campanula</i> , <i>Dianthus</i> , <i>Thymus</i> .	
alpinum , B grau, Bl weißfilzig, 15 – 20 cm, Juni/Juli T	2
Lewisia – Bitterwurz – Portulacaceae – ○ ◐	
Ausgesprochene Liebhaberpflanze für besondere Plätze auf Trockenmauern, wo für guten Wasserabzug gesorgt ist.	
N.: <i>Androsace</i> , <i>Aethionema</i> , <i>Potentilla nitida</i> , <i>Sempervivum</i> .	
cotyledon , B dunkelgrüne, fleischige Rosetten, Bl weiß mit rosa Streifen, 20 cm, Mai/Juni T	7
Linaria – Leinkraut – Scrophulariaceae – ○ ◐	
Raschwachsende Wildstaude zum Verfestigen von Trockenmauern, Stufen und Böschungen.	
N.: <i>Campanula portenschlagiana</i> , <i>Acaena</i> , <i>Sedum acre</i> .	
pallida , B efeublättrig, Bl lila mit weiß, 5 – 10 cm, Mai/September T	2
Linum – Lein – Linaceae – ○	
In allen Teilen zierliche Pflanzen, die zur Ansiedlung in Heide- und Polsterpflanzenflächen geeignet sind.	
N.: <i>Campanula</i> , <i>Calluna</i> und <i>Erica</i> , <i>Nepeta</i> .	
flavum 'Compactum' , Bl goldgelb, 20 cm, Juli/Aug. T	2
perenne , B nadelartig, blaugrün, Bl hellblau, 40–50 cm, Juni/Juli T	2
Lotus – Hornklee – Leguminosae – ◐ ○	
Gefülltblühende Form des heimischen Hornklee, der an sonnigen bis halbschattigen Plätzen grüne Teppiche bildet.	
N.: <i>Campanula</i> , <i>Polygonum affine</i> , <i>Saxifraga caespitosa</i> .	
corniculatus, 'Pleniflorus' , B dunkelgrün, zierlich, Bl gelborange, gefüllt, 10 – 15 cm, Juni/Juli T	2
Lysimachia – Pfennigkraut – Primulaceae – ○ ◐	
Dicht am Boden kriechende Wildstaude für halbschattige, feuchtebissumpfige Lagen.	
N.: <i>Ajuga</i> , <i>Myosotis palustris</i> , <i>Prunella</i> .	
nummularia , Brundlich, Bl goldgelb, 5 cm, Juni/Aug. T	1



Geranium subcaulescens splendens (G. A.), Storchenschnabel

Hepatica triloba, Leberblümchen

Hieracium x rubrum, Habichtskraut

	Preisgruppe
Mertensia – Blauglöckchen – Boraginaceae – (●) Hübsche Kleinstauden mit vergißmeinnichtblauen Glöckchen, die an halbschattigen Plätzen dichte Polster bilden. N.: <i>Aquilegia alpina</i>, <i>Moehringia</i>, <i>Saxifraga umbrosa</i>. primuloides, B graugrün, Bl blau, 15 – 20 cm, Mai/Juli T	3
Moehringia – Moosmiere – Caryophyllaceae – (●) (●) Eine der besten Teppichstauden in halbschattiger bis schattiger Lage, die auch in Mauerfugen Verwendung finden kann. N.: <i>Corydalis</i>, <i>Lysimachia nummularia</i>, <i>Tiarella</i>, <i>Waldsteinia</i>. muscosa, B hellgrün, feinnadelig, Bl weiß, sternförmig, 10 – 15 cm, Mai/September T	2
Nepeta – Katzenminze – Labiatae – (○) Silberlaubige, in allen Teilen aromatisch duftende Pflanze, die in vielen Pflanzengemeinschaften zu verwenden ist. N.: <i>Alyssum argenteum</i>, <i>Aster dumosus</i>, <i>Oenothera</i>. x faassenii, B graugrün, Bl lila, 30 – 40 cm, Mai/Aug. T x faassenii 'Blauknirps', (G. A.), eine hier entstandene Züchtung mit breiteren Blättern, und größeren, reinblauen Blüten. Mit ihrem gedungenen Wuchs und ihrer wesentlich längeren Blütezeit bis in den September, unterscheidet sie sich auffallend von der Stammart T	1 2
Oenothera – Nachtkerze – Oenotheraceae – (○) Unermüdlich blühende Teppichnachtkerze, die an sonnig bis halbschattigen Plätzen bis in den September hinein mit ihren großen Blütenschalen erfreut. N.: <i>Nepeta</i>, <i>Polygonum affine</i>, <i>Sedum spectabile</i>. missouriensis, B hellgrün mit rötlichen Stielen, Bl hellschwefelgelb, 20 – 25 cm, Juni/September T	2
Omphalodes – Waldvergißmeinnicht – Boraginaceae – (●) (●) Bodendeckender Frühjahrsblüher für Halbschatten, insbesondere zur Unterpflanzung von Gehölzen. N.: Kissenprimeln, <i>Viola odorata</i>, <i>Waldsteinia</i>. verna, B eirund, Bl himmelblau mit weißer Mitte, 10 – 15 cm, April/Mai T – 'Alba', B lanzettlich, Bl weiß, 10–15 cm, April/Mai T	2 2
Pachysandra – Ysander – Buxaceae – (●) (●) Wintergrüner Bodendecker, der überall Verwendung finden kann und Unkräuter mit Erfolg unterdrückt. N.: Farne, Schattengräser, <i>Hosta</i>. terminalis, B lederig, wintergrün, Bl weiß, 20–30 cm, Mai/Juni T	3
Papaver – Alpenmohn – Papaveraceae – (○) Der echte Alpenmohn mit zierlichem Laub und pastellfarbigen Blüten bringt eine erwünschte Abwechslung in den sommerlichen Polsterstaudenflor. N.: <i>Anthemis</i>, <i>Dianthus</i>, <i>Leontopodium</i>, <i>Silene</i> schaffta. alpinum, B blaugrün, Bl in bunter Mischung, 10 cm, Juni/September T	2
Patrinia – Goldbaldrian – Valerianaceae – (●) Selten anzutreffende Wildstaude, die einen besonderen Platz in halbschattiger Lage verdient. N.: <i>Gentiana asclepiadea</i>, <i>Podophyllum</i>, <i>Wulfenia</i>. triloba, B braungrün, Bl goldgelb, 20 – 30 cm, Juli/August T	5
Penstemon – Bartfaden – Scrophulariaceae – (○) Kleiner Halbstrauch mit purpurviolett Blüten, der auf sonnigen Trockenmauern und in Heidegärten besonders zur Geltung kommt. N.: <i>Dryas</i>, <i>Inula ensifolia</i>, <i>Thymus</i>, <i>Veronica</i>. x scouleri, Bl purpurviolett, B graugrün/wintergrün, 25 cm, Mai/Juni. T	4



Iberis saxatilis, Schleifenblume
Leontopodium alpinum, Edelweiß
Moehringia muscosa, Moosmiere

Phlox – Teppichflammenblume –**Polemoniaceae – ○ ◐**

Neben dem Blaukissen zählen die Teppichphloxe zu den farbenprächtigsten Frühjahrsblüchern unter den Polsterstauden.

N.: Alyssum, Arabis, Aubrieta, Saxifraga, Veronica.

douglasii 'Georg Arends', (G. A.), B nadelartig, wintergrün, Bl rötlichlila, 10 cm, Mai/Juni T 2

subulata 'Blütenfülle', (G.A.) B nadelartig, wintergrün, Bl leuchtendrosa, 10 cm, Mai/Juni T 2

– 'G.F. Wilson', B nadelartig, wintergrün, Bl schieferblau, 10 – 15 cm, Mai/Juni T 2

– 'Maischnee', (G. A.), B nadelartig, wintergrün, Bl weiß, großblumig, 10 cm, Mai/Juni T 2

– 'Temiskaming', B nadelartig, wintergrün, Bl leuchtendrot, 10 cm, Mai/Juni T 2

Phyteuma – Teufelskralle –**Campanulaceae – ○ ◐**

Interessante Bergstaude mit kugeligen Blütenköpfen zur Belebung des sommerlichen Staudenflors.

N.: Androsace, Campanula, Gentiana septemfida, Potentilla.

scheuchzeri, B lanzettlich, Bl dunkelblau, 25–30 cm, Mai/Juni T 2

Plantago – Wegerich – Plantaginaceae ○

Reizvolle Liebhaberpflanze für Tröge und Steingarten. Unscheinbare weiße Blüten, aber interessantem Habitus.

N.: kleinrosettige Saxifragen, Lewisia, Globularia

nivalis, B weißfilzig, dem Boden angepreßte Blattrosetten, liebt trockene, sonnige Lage an Steinen und in Steinritzen T 3

Polygonum – Knöterich – Polygonaceae – ○ ◐

Starkwachsender Dauerblüher mit rosa und roten Blütenähren, der zur schnellen Begrünung von Böschungen und Flächen bestens erprobt ist.

N.: Cerastium, Nepeta, Oenothera missouriensis.

affine 'Superbum', B braungrün, Bl rosa bis rot, 25 cm, Juni/September T 1

– 'Donald Lowndes', B breitlanzettlich, Bl korallenrosa in breiten Ähren, kompakter Wuchs, 20 cm, Juli/September T 3

Potentilla – Fingerkraut – Rosaceae – ○

Reichblühende, niedrige Polsterstaude zur Verwendung an sonnigen Plätzen.

N.: Aubrieta, Thymus, Veronica.

ternata, B glänzend grün, Bl goldg., 10 cm, Mai/Juni T 2

– 'Aurantiaca', (G.A.), Bl orange, 10 cm, Mai/Juni T 2

Prunella – Braunelle – Labiatae –

Spätblühende Wildstaude, die in Verbindung mit Heide- und Polsterpflanzen gut zu verwenden ist.

N.: Campanula, Potentilla ternata, Veronica incana.

x grandiflora, Bl violettblau 20 cm, Juli/August T 2

Ramonda – Felsenteller – Gesneraceae – ◐

Seltene Liebhaberpflanzen, die in Mauerfugen an absonniger Stelle ihren besten Standort haben.

N.: Asplenium trichomanes, Soldanella montana.

myconi, B dunkelgrün, Rosetten, Bl dunkellila, 10 cm, Mai/Juni T 8

– 'Alba', wie vorige, Bl weiß T 8

Sagina – Sternmoos – Caryophyllaceae – ○ ◐

Allgemein bekanntes Sternmoos zur Bodenbegrünung und in Plattenfugen.

subulata, B moosartig, Bl weiß, sternförmig, 5 cm, Juni/August 1


Santolina – Heiligenblume – Compositae – ○

Kleiner, immerbelaubter Halbstrauch mit aromatischem Duft, der mit seinen gelben Blüten Heidegärten und Staudenpflanzungen wirksam belebt.

N.: Calluna, Erica, Gräser, Gypsophila.

tomentosa, B silbergrau, Bl dunkelgelb, 30 – 40 cm, Juli/August T 2

virens, B dunkelgrün, Bl hellgelb, 30 – 40 cm, Juli/August T 2




Oenothera missouriensis, Nachtkerze

Phlox subulata (G. A.), Polsterphlox

Phlox douglasii (G. A.), Douglas-Teppichphlox

	Preisgruppe
Saponaria – Seifenkraut – Caryophyllaceae – ○ Reichblühende Polsterstaude für sonnige Lage zum Beranken von Trockenmauern und Fugen. N.: Campanula, Gypsophila, Helianthemum. ocymoides, Bl rosarot, 10 – 15 cm, Juni T 2 x olivana, Bl rosa, B hellgrün, feste Polster, 5 cm, Juni/Juli T 4	
Satureja – Bergminze – Labiatae – ○ Kleinstauden und Halbsträucher mit aromatischem Duft, die insbesondere in Heidepartien ihren richtigen Platz haben. N.: Armeria, Helianthemum, Hypericum polyphyllum. montana 'Coerulea', (G. A.), Bl blau, 30 cm, August/September. T 3	
Saxifraga – Steinbrech – Saxifragaceae – ○ ⊕ Eine große Pflanzenfamilie, deren Vertreter in ihrem Aussehen wie auch in ihren Lebensbedingungen sich stark unterscheiden. Moossteinbrech: Dankbare, reichblühende und wintergrüne Polsterpflanzen, die sich an halbschattigen Plätzen wohlfühlen und bei genügender Bodenfeuchtigkeit auch in voller Sonne gedeihen. N.: Aubrieta, Geum, Phlox subulata, Potentilla. x arendsii 'Blütenesschicht' (G. A.), B moosartig, Bl karminrosa, 15 – 20 cm, April/Mai T 2 – 'Purpureschicht', (G. A.), B moosartig, Bl hellkarminrot, 15 – 20 cm, April/Mai T 2 – 'Schneescharte', (G. A.), B moosartig, Bl weiß, großblumig, 15 – 20 cm, April/Mai T 2 – 'Schwefelblüte', (G. A.), B moosartig, Bl hell-schwefelgelb, 10 – 15 cm, April/Mai. T 2 – 'Triumph', (G. A.), B moosartig, Bl leuchtendrot, 15 cm, April/Mai T 2 muscoideus 'Findling', (G. A.), B festes dunkelgrünes Polster, Bl weiß, 10 – 15 cm, Mai T 2	
Schattensteinbrech: Starkwachsende Steinbrecharten, die an halbschattigen Plätzen dichte Flächen bilden. N.: niedrige Astilben, Epimedium, Moehringia, Waldsteinia. spathulata (cuneifolia), B spatelförmig, wintergrün, Bl weiß, bester Begrüner, selbst im tiefsten Schatten!, Mai, 15 – 20 cm T 2 umbrosa, 'Aureopunctata', B gelbbunt, Bl rosa-weiß, 25 cm, Mai T 2 – 'Elliot's Variety', B dunkelgrüne Rosetten, 20 cm, Mai T 2	
Kleinrosettiger Steinbrech: Mit wenigen Ausnahmen langsam wachsende Steinbrecharten, die an absonnigen, aber hellen Plätzen in Mauern oder an ausgesuchten Stellen im Steingarten zu verwenden sind. N.: Draba, Campanula garganica, Ramonda, Sempervivum x apiculata, B graugrün, Bl hellgelb, 10 cm, März/April T 4 burseriana, B grau, nadelförmig, Bl weiß, 5 cm, März/April T 4 – 'Sulphurea', B grau, nadelförmig, Bl schwefelgelb, 5 cm, März/April T 4 x elisabethae, B hellgrün, nadelförmig, Bl hellgelb, 5 cm, März/April T 4 x haagii, B dunkelgrün, nadelförmig, Bl goldgelb, 5 – 10 cm, März/April T 4 x salomonii, B grau, Bl weiß, 3 – 5 cm, März/April. T 4	
Sedum – Mauerpfeffer – Crassulaceae – ○ ⊕ Reichgegliederte Pflanzenart, die als Sommer- und Herbstblüher unentbehrlich und für Heidegärten, Steingärten, Staudengruppen, wie auch als Bodendecker, geeignet ist. N.: Aster dumosus, Campanula, Festuca, Nepeta. acre, B wintergrün, Bl gelb, 5 – 10 cm, Juni/Juli . T 1 album 'Coral Carpet', B im Herbst bronzerot, Bl weiß, 5 cm, Juli/August T 1 – 'Laconicum', B braungrün, wintergrün, Bl weiß, 10 cm, Juni/Juli T 1 – 'Murale', B braunrot, wintergrün, Bl rosa, 10 cm, Juni/Juli T 1 cauticolum, B schieferblau, Bl weinrot, 5 – 10 cm, September/Oktobre T 2 – 'Robustum', (G. A.), B blaugrün, Bl weinrot, 15 – 20 cm, August/September T 2	



Polygonum affine superbum, Knöterich

Ramonda myconi, Felsenteller

Saxifraga x arendsii (G. A.), Moos-Steinbrech

Sedum – Fortsetzung

floriferum 'Weihenstephaner Gold', B dunkelgrün, Bl leuchtendgelb, 20 cm, guter Bodendecker, Juni/August T	1
hybridum 'Immergrünchen', B im Winter rötlich, Bl gelb, 20 cm, Juli/August T	1
kamtschaticum , B bräunlich, Bl orange gelb, 10 cm, Juli/August T	1
– ssp. reflexum , B hechtgrau, Bl gelb, 10 – 15 cm, Juli T	1
spathulifolium , B wintergrün, Bl gelb, 10 cm, Mai/Juni T	2
– 'Capa Blanca', B grauweiß, wintergrün, Bl gelb, 5 – 10 cm, Mai/Juni T	2
– 'Purpureum', B dunkelrot, Bl gelb, 5 – 10 cm, Mai/Juni T	2
spurium , 'Album Superbum', (G. A.), B wintergrün, Bl weiß, 10 – 15 cm, Juli/August, Guter Bodendecker! T	1
– 'Purpurteppich', B purpurrot, wintergrün, Bl purpurrot, 10 – 15 cm, Juli/August T	1
– 'Splendens', Bl leuchtendkarminrot, 10 – 15 cm, Juli/August T	1

Sempervivum – Hauswurz – Steinrose –**Crassulaceae** – ○

Eine vielgestaltige Pflanzengattung mit meist rundlichen oder sternförmigen Blattrosetten für sonnige Mauer- und Steinfugen, wie auch karge, steinige Pflanzstellen in Stein- oder Heidegärten.

N.: *Draba*, *Potentilla nitida*, *Gypsophila*, *Campanula pusilla*.

arachnoideum , B Rosetten weiß übersponnen, Bl rot, 10 – 15 cm, Juli T	2
blandum , B mittelgroß, braun innen grün, Bl rosa, April/Mai T	2
x funkii , B grün, Bl rot, 10 – 15 cm, Juli T	2
x hybr. 'Alpha', (G. A.), B hellbraun, leicht übersponnen, Bl rosa, 10 – 15 cm, Juli T	2
– 'Beta', (G. A.), B rotbraun, leicht übersponnen, Bl dunkelrosa, 10 – 15 cm, Juli T	2
– 'Gamma' (G.A.), B mittelgroß, tiefbraune Rosetten, silbern behaart, Bl rosa, April/Mai T	2
– 'Rheinkiesel', B kleinrosetzig, silbrig übersponnen, Bl rosa T	2
– 'Rubin', B leuchtendrot, Bl rosa, 10 – 15 cm, Juli T	2
– 'Topas', B lilabraun, Bl rosa, 10 – 15 cm, Juli T	2
ruthenicum , B graugrün, Bl gelb, 10 – 15 cm, Juli T	2
schlehanii 'Rubicundum', B braunrot, Bl purpurrosa, 10 – 15 cm, Juli T	2

Silene – Leimkraut – Caryophyllaceae – ○ ◐

Dankbarer Sommer- und Herbstblüher für Trockenmauern und Steingärten.

N.: *Artemisia*, *Campanula*, *Satureja*, *Sedum*.

maritima 'Weißkehlchen', B graugrün, Bl weiß, 20 cm, Juni/August T	2
schafta 'Splendens', (G. A.), Bl leuchtendrosa, 10 cm, August/September T	2

Soldanella – Alpenglöckchen – Primulaceae – ◐

Reizender alpiner Vorfrühlingsblüher mit zierlich gefransten dunkellila Glöckchen für einen besonderen Platz an feuchtsumpfigem Standort.

N.: *Hepatica*, Kissenprimeln, Zwergfarne.



montana , B glänzend grün, Bl dunkellila, 10 – 15 cm, März/April T	5
---	---

Thymus – Thymian – Labiatae – ○

Aromatisch duftende Polsterstaude für Heide- und Steingärten, wo sie noch an mageren, trockenen Stellen dichte Blütenteppiche bildet.

N.: *Acaena*, *Arabis*, *Armeria*, Gräser.

doerfleri 'Bressingham's Seedling', B Polster üppig hellgrün, Bl rosa, 8 cm, Mai/Juni T	2
serpyllum 'Albus', B hellgrün, Bl weiß, 5 cm, Juni/Juli T	2



Sedum caut. Robustum (G. A.), Mauerpfeffer

Sedum spathulifolium, Mauerpfeffer

Sempervivum arachnoideum, Spinnweb-Dachwurz

	Preisgruppe
Thymus - Fortsetzung	
– 'Coccineus', B dunkelgrün, Bl karminrot, 5 cm, Juni/Juli T	2
pseudolanuginosus , B grauwoilig, Bl rosa, 5 cm, Juni/Juli T	2
Tiarella – Schaumblüte – Saxifragaceae – ☉ ☉	
Gute, ausläufertreibende Kleinstauden mit schleierartigen Blütenrispen und buntem Herbstlaub für halbschattige bis schattige Plätze.	
N.: Anemone japonica, Kissenprimeln, Moehringia.	
cordifolia , B wintergrün, Bl cremeweiß, 20 – 30 cm, April/Mai T	1
wherryi , B hellgrün, braun gezeichnet, Bl cremeweiß, 30 cm, Mai/Juli T	2
Tunica – Felsnelke – Caryophyllaceae – ○	
Eine zierliche, langblühende nelkenartige Pflanze für sonnige Stellen in Trockenmauer, Heide und Steingärten.	
N.: Inula, Linum, Silene, Thymus.	
saxifraga 'Rosette' , B nadelartig, Bl dunkelrosa, gefüllt, 20 cm, Juli/September T	4
Veronica – Ehrenpreis – Scrophulariaceae – ○	
Wertvolle Polsterstaude für sonnigen Standort mit meist leuchtendblauen Blütenkerzen, womit sie in vielen Pflanzengemeinschaften sehr willkommen ist.	
N.: Campanula, Helianthemum, Potentilla, Oenothera.	
incana , B silbergrau, Bl dunkelblau, 20 – 30 cm, Juni/Juli T	2
prostrata , Bl leuchtendblau, 10 cm, Juni T	2
spicata 'Heidekind' , B graugrün, Bl rosarote Kerzen, 10 cm, Mai/Juni T	2
teucrium 'Shirley Blue' , Bl enzianblau, 15 – 20 cm, Juni T	2
Vinca – Immergrün – Apocynaceae – ☉ ☉	
Bekanntes Immergrün, das für großflächige Unterpflanzungen bestens geeignet ist.	
N.: Epimedium, Hosta, Pulmonaria.	
minor , B wintergrün, Bl blau, 10 cm, April/Mai . . . T	2
Viola – Hornveilchen – Violaceae – ○ ☉	
Unermüdlicher Blüher vom Frühjahr bis Herbst für sonnige bis leicht schattige Plätze.	
N.: Arabis, Iberis, Phlox subulata, Primula elatior.	
cornuta 'Altona' , Bl cremegelb, 15 – 20 cm, Mai/September T	2
– 'Germania', Bl dunkelviolett, 15 – 20 cm, Mai/September T	2
– 'White Superior', Bl reinweiß, großblumig, 15 – 20 cm, Mai/September T	2
– 'Woodgate', Bl leuchtendblau, 15 – 20 cm, Mai/September T	2
Viola – Veilchen – Violaceae – ○ ☉	
Allgemein beliebtes Vorfrühlings- oder Duftveilchen, das an halbschattigen, nicht zu trockenen Stellen bestens gedeiht.	
N.: Hepatica, Helleborus, Kissenprimeln.	
odorata 'Königin Charlotte' , Bl blauviolett, 15 – 20 cm, März/April T	2
Waldsteinia – Golderdbeere – Rosaceae – ○ ☉	
Frohwüchsige, wintergrüne Bodendecker für halbschattigen bis schattigen Standort, wo sie auch noch in trockenen Böden gedeihen.	
N.: Asperula, Asarum, Omphalodes.	
geoides , Bl gelb, 20 cm, April/Mai T	2
ternata , B glänzendgrün, Bl gelb, 10 cm, Mai, Ausläufertreibend T	1
Wulfenia – Wulfenie – Scrophulariaceae – ☉	
Wenig bekannte Wildstaude mit wintergrünen Blattrosetten zur Verwendung an halbschattigen, feuchten Plätzen.	
N.: Corydalis, Dicentra formosa, Tiarella.	
carinthiaca , B wintergrün, ledrig, Bl blau, 20 cm, Juli/August T	4



Soldanella montana, Alpenglöckchen

Tiarella cordifolia, Schaumblüte

Tunica saxifraga 'Rosette'

Winterharte Ziergräser

Seit jeher werden Gräser in unseren Gärten verwendet, dennoch wurde der wahre Gartenwert dieser vielgestaltigen Pflanzengruppe erst in jüngster Zeit richtig erkannt. Ohne Avena, Festuca, Panicum, Pennisetum u. a. kommt weder ein Heidegarten noch eine Staudenpflanzung zur vollen Wirkung. Ebenso ist es bei Wald- und Schattenstaudenpflanzungen oder bei Rhododendrongruppen, die ohne Zwischenpflanzungen von Carex, Deschampsia, Luzula u. a. unvollständig wären. Selbst im Winter erfreuen Gräser noch durch ihre bizarr geformten Halme und Samenstände. Schließlich sei noch auf ihre Verwendungsmöglichkeiten in bunten Sommer-, Herbst- o. Trockensträußen hingewiesen.

Arrhenatherum – Glatthafer – Gramineae – ○ ✂
elatius var. bulbosum 'Variegatum', B weißbunt,
 20 – 30 cm, Juli/August T

2

Avena – Blaustrahlhafer – Gramineae – ○

pendula, B stahlgrau, breiter als sempervirens, 80 cm,
 Juni/Juli T

2

sempervirens, B blaugrau, 80 – 100 cm, Juni/Juli T

2

Briza – Zittergras – Gramineae – ○ ✂

media, niedrige Rasenpolster, Bl Rispen mit herzförmigen Ähren, 40 cm, Mai/Juni T

2

Calamagrostis – Garten-Sandrohr –

Gramineae – ○

epigeios 'Hortorum', B hellgrün, Bl aufrechte, braune Halme mit Ähren-Rispen, 100 – 120 cm,
 Juli/August

3

Carex – Segge – Cyperaceae – ○ ◐ ◑

grayi, Morgensternsegge, B dreikantig, lineal-lanzettlich, dekorative, morgensternartige Fruchtstände. Verträgt nassen Standort, 80 cm, Juli/August T

4

montana, robuster Bodendecker, 20 cm T

2

morrowii 'Variegata', B dunkelgrün, goldgelb gestreift, wintergrün, Bl gelb, 30 – 40 cm, April/Mai T

4

pendula, große Waldsegge, B dunkelgrün, wintergrün, Bl überhängende Halme mit langen Ähren, 70 – 80 cm,
 Juni/Juli

4

Cortaderia – Pampasgras – Gramineae – ○ ✂

selloana, B graugrün, dekorativ überhängend, Bl große Ähren, die silberweiße Fahnen bilden, 150 – 200 cm, August/Oktobre, Pflanzung im Frühjahr T

13

Deschampsia – Waldschmieie –

Gramineae – ○ ◐ ◑

caespitosa, B wintergrün, Bl braune Blütenrispen, 80 – 100 cm, Juni/Juli

3

Elymus – Blaustrandhafer – Gramineae – ○

arenarius (glaucus hort.), B stahlblau, leicht bereift, Ähren gelblichbraun, 100 cm, Juni/Juli. . T

3

Festuca – Schwingelgras – Gramineae – ○

glauca, B silbrigblau, 15 – 20 cm, Juni/Juli T

1

– **'Frühlingsblau'**, B blau, üppig wachsend, 15 – 20 cm, Juni/Juli T

1

– **'Palatinat'**, B kräftigsilbrigblau, 10 – 15 cm, Juni/Juli

1

ovina 'Harz' (G.A.), B dunkelblaugrün, 20 – 25 cm, Juni/Juli T

2

scoparia, Bärenfellgras, B hellgrün, dichte Polster, 10 – 15 cm, Juni/Juli T

1

Koeleria – Schillergras – Gramineae ○

glauca, B graugrün, 20 – 25 cm Juni/Juli T

1

Luzula – Hainsimse – Juncaceae – ○ ◐ ◑

nivea, Schneemarbel, B dunkelgrün, behaart, wintergrün, Bl weiß, 30 – 40 cm, Juni–Juli T




1

sylvatica, Waldmarbel, B breit, dunkelgrün glänzend, wintergrün, 30 – 40 cm, Juni/Juli T

1

– **'Tauernpaß'**, B hellgrün, breit, 20 cm, Mai/Juni T

2



Carex morrowii 'Variegata', Segge
Festuca glauca 'Frühlingsblau', Schwingelgras
Pennisetum compressum, Lampenputzergras

	Preisgruppe
Miscanthus – Chinaschilf – Gramineae – ○ ✂	
japonicus , Riesenchinaschilf, B schilfartig, mit weißem Mittelstreifen, überhängend, 200–300 cm	ab 8
sacchariflorus , Silberfahnengras, B schilfartig mit rotbraunem Mittelstreifen, Bl silberweiß, 120–150 cm, September/Oktobre	ab 6
sinensis 'Gracillimus', Feinhalm Miscanthus, B schilfartig mit weißem Mittelstreifen, überhängend, 100–120 cm, September/Oktobre	ab 8
– 'Silberfeder', Neuheit!, Bl silberweiß, das einzige jährlich blühende Chinaschilf, 150–180 cm, August/September, Wertzeugnis!	ab 8
Molina – Pfeifengras – Gramineae – ○	
altissima 'Karl Foerster', graziöser hoher Wuchs mit schmalen, abstehenden Blütenrispen. Besonders wertvoll und wirkungsvoll durch die goldgelbe Herbstfärbung der Pflanze. B dunkelgrün, Bl 120–150 cm, August/Oktobre	6
Panicum – Rutenhirse – Gramineae – ○ ✂	
virgatum , B grünbraun, rötliche Herbstfärbung, Bl braun, 80–100 cm, Juli/August	6
– 'Rehbraun', B rotbraun, Bl braun, 80 cm, Juli/August	6
Pennisetum – Lampenputzergras – Gramineae – ○ ✂	
compressum , B graugrün, Bl rotbraune Ähren mit silbrigen Grannen, 60–80 cm, Juli/August	4
– 'Hameln', Bl rotbraune Ähren, früh und reichblühend, gute Verbesserung von compressum, 60 cm, August/Oktobre	4
Sinarundinaria – Gartenbambus – Gramineae – ○ ●	
sehr dekorative Solitärpflanze für sonnige bis halbschattige Lage an künstlichen Wasserbecken etc.	
murilae , B glänzend dunkelgrün an rohrartigen harten Stengeln, 200 cm, 40–60 cm T	ab 14
Spartina – Goldbandleistengras – Gramineae – ○ ✂	
michauxiana 'Aureomarginata', B grün mit Goldrand, überhängend, 150 cm, August/September	5
Stipa – Federgras – Gramineae – ○ ✂	
barbata , Reiherfedergras, B schmal, Bl silberweiße, überhängende Samenstände, 60–80 cm, Juli/Aug. T	6
calamagrostis , Silberährengas, Bl gelblichweiße Ähren, 60–80 cm, Juli/August	4
capillata 'Brautschleier' (Pfriemengras), Bl 60 cm hoch mit weit abstehenden, langen Grannen. Sehr schön T	4
pennata , Mädchenhaargras, Bl mit langen, fedrigen Grannen, 50–60 cm, Juni/Juli T	5



Freilandfarne

Die arten- und formenreiche Familie der Freilandfarne ist in halbschattigen bis schattigen Lagen beheimatet und sollte in unseren Gärten entsprechend Verwendung finden. Die Gruppe der Waldfarne eignet sich vorzüglich zur Auflockerung von bodenbedeckenden Pflanzungen oder zur Belebung von Gehölzgruppen. Manche von ihnen gedeihen noch in trockensten Böden und im Wurzelwerk von Strauchgruppen. Andere wieder bevorzugen feuchtere Plätze oder kommen im Sumpf zur vollen Entwicklung. Die niedrigen Arten der Waldfarne bringen neben den ausgesprochenen Mauerfarnen für feuchte, absonnige Steinfugen in Trockenmauern eine willkommene Abwechslung.

Asplenium – Braunstiel-Streifenfarn – Polypodiaceae – ● ●

Ein Mauerfarn, der mit seinen schwarzbraun gestielten Wedeln in absonnigen Mauerfugen am besten gedeiht.

trichomanes, B wintergrün, 10–15 cm T 4



Athyrium filix-femina, Frauenfarn

Matteuccia struthiopteris, Becherfarn

Phyllitis scolopendrium 'Undulatum', Hirschzunge

○ = volle Sonne


◐ = Halbschatten

◑ = Schatten

	Preisgruppe
Athyrium – Frauenfarn – Polypodiaceae – ○ ◐ ◑	
Anspruchsloser Waldfarn zur Verwendung an halbschattigen bis schattigen Plätzen, wo sie auch Trockenheit vertragen.	
filix-femina , B feingefiedert, hellgrün, 50 – 80 cm	4
Blechnum – Rippenfarn – Polypodiaceae – ◐ ◑	
Heimischer, wintergrüner Waldfarn, der sich an schattigen Stellen mit genügender Bodenfeuchtigkeit wohlfühlt.	
spicant , B ledrig, wintergrün, aufrechte, dekorative Sporenwedel, 20 – 30 cm	4
Dryopteris – Wurmfarne – Polypodiaceae – ○ ◐ ◑	
Starkwachsender Waldfarn mit unterschiedlichen Wuchs- und Wedelformen, zur Belebung von Schattenpartien, wo sie auch noch an trockenen Plätzen gut gedeihen.	
filix-mas , B einfach gefiedert, breitwedelig, 50 – 80 cm	4
– ‘ Pinderi ’, B schmale, aufrechte dunkelgrüne Wedel, 50 – 70 cm	ab 6
– ‘ Linearis ’, B filigranartig gefiedert, 50 – 70 cm	ab 6
spinulosa , Dornfarn, B Wedel überhängend, 80 – 100 cm	ab 6
Matteuccia – Becherfarn – Polypodiaceae – ◐ ◑	
Im Austrieb einer der auffälligsten Farne, da sich die jungen Wedel gleichzeitig entfalten und somit einen trichterförmigen, hellgrünen Wedelbecher bilden.	
struthiopteris , B einfach gefiedert, 60 – 80 cm	4
Onoclea – Perlfarn – Polypodiaceae – ◐ ◑	
Interessanter, Feuchtigkeit liebender Farn, dessen Sporen an besonderen Wedeln perlförmig angeordnet sind.	
sensibilis , B dreieckige Wedel, 20 – 30 cm	8
Osmunda – Königsfarn – Osmundaceae – ◐ ◑	
Auffallende Erscheinung der vielgestaltigen Farn-Familie, der überall gedeiht, sich aber an sumpfigen Stellen besonders gut entwickelt.	
regalis , B breitausladende, grobgefiederte Wedel, 50 – 100 cm	ab 9
Phyllitis – Hirschzunge – Polypodiaceae – ◐ ◑	
Wintergrüner Farn mit zungenförmigen Wedeln, der an halbschattigen und feuchten Stellen, selbst in Mauerfugen gut gedeiht.	
scolopendrium , B ungeteilt, wintergrün, 20–30 cm T	6
– ‘ Undulatum ’, B ungeteilt, gewellt, wintergrün, 20 – 30 cm	8
Polypodium – Tüpfelfarn – Polypodiaceae – ◐ ◑	
Wintergrüner Mauerfarn, der sich an schattigen Plätzen durch Ausläufer ausbreitet.	
vulgare , B grob gefiedert, wintergrün, 20 – 25 cm	3
Polystichum – Wurmfarne – Polypodiaceae – ◐ ◑	
Ansehnliche, meist wintergrüne Waldfarne mit verschiedenartig geformten Wedeln, die in Rhododendron- und Gehölzgruppen gut zur Wirkung kommen.	
aculeatum , Glanzschildfarn, B ledrig, glänzendgrün, wintergrün, 40 – 60 cm	ab 6
setiferum ‘Proliferum’ , B feinzerteilt, mit braunen Schuppen, wintergrün, 30 – 40 cm	ab 7

Sumpf- und Wasserpflanzen

Ein Wasser- oder Sumpfbecken kann zur Zierde eines jeden Gartens werden, wenn es mit den entsprechenden Wasser- oder Sumpfstauden bepflanzt ist. Hierfür halten wir eine Reihe von Pflanzen zur Verfügung, die schon mit einem geringen Wasserstand von 5 – 30 cm zufrieden sind. Andere dagegen vertragen einen höheren Wasserstand oder siedeln sich im Laufe der Zeit in tieferen Gewässern an. In Wasseranlagen, die keinen natürlichen Pflanzboden haben oder



Polypodium vulgare, Tüpfelfarn

Polystichum lobatum, Wurmfarne

Vorgarten:

Rhododendron, versch. Farne, Cyclamen, etc.

	Preisgruppe
nicht mit einer Erdschicht ausgestattet werden können, benutzt man für die Pflanzen Schalen oder andere Gefäße, denen man durch Unterlegen von Steinen einen höheren oder geringeren Wasserstand geben kann. Ebenfalls können durch den trockenmauerartigen Aufbau von Steinen Pflanzstellen geschaffen werden. Die Pflanzerde soll möglichst lehmig sein und nach dem Bepflanzen mit Sand oder Kies abgedeckt werden, um eine Trübung des Wassers zu vermeiden.	
Acorus – Kalmus – Araceae – ○ ●	
calamus , B schilfartig, Bl gelblichgrün, 60 – 80 cm, Juni/Juli, Wasserstand: 10 – 20 cm	4
– ‘ Variegatus ’, B schilfartig, weißbunt, 40 – 60 cm, Wasserstand: 10 – 20 cm	6
Alisma – Froschlöffel – Alismataceae – ○ ●	
plantago-aquatica , B löffelförmig, Bl weiße schleierartige Rispen 60 – 70 cm, Juli/September, Wasserstand: 5 – 10 cm	3
Butomus – Blumenbinse – Butomaceae – ○	
umbellatus , B schilfartig, Bl rosa, dunkel geadert, 60 – 80 cm, Juli/August, Wasserstand 10 – 30 cm	3
Calla – Sumpfdrachenwurz – Araceae – ○	
palustris , B herzförmig, Bl weiße Hochblätter, gelber Blütenkolben, Früchte korallenrot, 15 – 20 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 3 – 5 cm	4
Caltha – Sumpfdotterblume – Ranunculaceae – ○ ●	
palustris ‘ Multiplex ’, Bl goldgelb, gefüllt, 15 – 20 cm, April/Mai, Wasserstand 5 cm	4
Glyceria – Süßgras – Gramineae – ○	
aquatica ‘ Variegata ’, B weißbunt, im Herbst rötlich gefärbt, 50 – 60 cm, Juli/August, Wasserstand: 10 – 20 cm	3
Hippuris – Tannenwedel – Hippuridaceae – ○ ●	
vulgaris , B tannennadelartig, Bl rötlich, 20 – 30 cm, Mai, Wasserstand: 5 – 30 cm	3
Iris – Wasserschwertlilie – Iridaceae – ○	
pseudacorus , B blaubereift, Bl gelb, 60 – 80 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 5 – 30 cm	3
Lysichiton – Scheincalla – Araceae – ○ ●	
americanus , Bl Hochblätter gelb, Blütenkolben grünlich, 40 – 50 cm, April/Mai, Wasserstand: 5 – 10 cm	10
Menyanthes – Fieberklee – Gentianaceae – ○ ●	
trifoliata , B dreiteilig, dunkelgrün, Bl weißrosa gefranst, 20 – 30 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 5 – 10 cm	3
Mimulus – Gauklerblume – Scrophulariaceae – ○ ●	
luteus , B frischgrün, Bl leuchtendgoldgelb, 20 cm, Juni/August, Wasserstand: bis 5 cm	3
Myosotis – Sumpfvergißmeinnicht – Boraginaceae – ○ ●	
scorpioides ‘ Thüringen ’, Bl blau, 20 – 30 cm, Mai/September, Wasserstand: 5 – 10 cm	1
Nuphar – Mummel – Nymphaeaceae – ○ ●	
luteum , B schwimmend, rund, Bl gelb, Juni/Juli, Wasserstand: 30 – 60 cm	10
Nymphoides – Sumpfrosee – Gentianaceae – ○	
peltata , B schwimmend, rund Bl gelb, schwimmend, Juli/August, Wasserstand: 10 – 20 cm	4
Orontium – Goldkolben – Araceae – ○	
aquaticum , B lanzettlich, graugrün, Bl goldgelb, 30 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 30 cm	13
Pontederia – Hechtkraut – Pontederiaceae – ○	
cordata , Bl lichtblau, 50 – 60 cm, Juli/August, Wasserstand: 10 – 30 cm	10



Caltha pal. 'Multiplex', Sumpfdotterblume
 Lysichiton americanus, Gelbe Scheincalla
 Nymphaea, Seerose

	Preisgruppe
Ranunculus – Sumpfhahnenfuß – Ranunculaceae – ○ ◐	
lingua , Bl gelb, 60 – 80 cm, Juli/August, Wasserstand: 5 – 10 cm	3
Sagittaria – Pfeilkraut – Alismataceae – ○	
sagittifolia , B pfeilförmig, Bl weiß mit purpurrotem Auge, 30 – 50 cm, Juni/Juli, Wasserstand: 5 – 20 cm	3
Scirpus – Simse – Cyperaceae – ○ ◐	
lacustris , Seesimse, B dunkelgrün, zylindrisch, Bl schwarzbraune Ähren an blaugrünen Halmen 100 – 120 cm, Juni/August, Wasserstand: 5 cm	4
tabernaemontani 'Zebrinus', Zebrasimse, B weiß quergestreift, peitschenförmig, 80 – 100 cm, Juni/August, Wasserstand: 5 – 10 cm	5
Typha – Rohrkolben – Typhaceae – ○	
angustifolia , B schmal, Bl rotbraune Kolben, 120 – 150 cm, Juli/August, Wasserstand: 10 – 30 cm . . .	6
latifolia , B breit, blaugrün, Bl schwarzbraune Kolben, Juli/September, 150 – 200 cm, Wasserstand: 10 – 50 cm	6
minima , B zierlich, Bl schwarzbraune Kolben, 40 – 60 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 5 – 10 cm	6
Zizanyopsis – Wilder Reis – Gramineae – ○	
microstachya , B schilfartig, überhängend, 100 – 150 cm, Wasserstand: 10 – 30 cm	5

Nymphaea

Seerose - Nymphaeaceae - ○

Eine prächtige Zierde in jedem Teich oder Wasserbecken sind die weiß- oder farbigblühenden Seerosen, die uns von Ende Juni bis Mitte September mit ihren edlen Blüten erfreuen.


Zu ihrem guten Gedeihen verlangen sie stehendes Wasser in sonniger Lage. Für schwachwachsende Sorten sollte der Wasserstand 30 – 40 cm, für starkwachsende Sorten 50 – 80 cm betragen. Es ist vorteilhaft, bei Neuanpflanzungen den Wasserstand dem Wachstum der Blätter anzupassen, d. h. den oben erwähnten Wasserstand erst nach und nach zu geben. Sollten die Seerosen nicht gleich in natürliche Böden gepflanzt werden können, verwendet man Tonschalen oder dichtgeflochtene Weidenkörbe, die in den Becken dem Wachstum der Pflanzen entsprechend versenkt werden können. Die Pflanz Erde sollte aus zwei Dritteln Lehm und einem Drittel Gartenerde oder Kompost gemischt werden. Ein anschließendes Bedecken der Erde mit Sand oder grobem Kies verhindert eine Trübung des Wassers.

In Becken, die ständig mit Wasser gefüllt bleiben, können die Pflanzen ohne Bedenken überwintern. Im anderen Falle werden Seerosen mit einer Laubschicht abgedeckt; in Behälter ausgepflanzte Seerosen werden in kühlen Räumen überwintert, wo ein völliges Austrocknen verhindert werden muß.

'James Brydon' , Bl dunkelrot, gefüllt, Ø 12 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	22
'Escarboucle' , Bl leuchtendrubinrot, Ø 18 cm, Juni/ September, Wasserstand: 40 – 60 cm	22
'Laydekeri Purpurata' , Bl karminrot, Ø 12 cm, Halbzweig, Juni/September, Wasserstand: 20 – 40 cm	20
'Marliacea Albida' , Bl reinweiß, duftend, Ø 20 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	20
'Marsaniello' , Bl dunkelrosa, duftend, Ø 20 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	20
'odorata Sulphurea' , Bl hellgelb, Ø 20 cm, Juni/ September, Wasserstand: 40 – 60 cm	20
'Pöstlingberg' , Bl weiß, großblumig, Ø 30 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	20
'Richardsonii' , Bl weiß, Ø 12 cm, Halbzweig, Juni/ September, Wasserstand: 20 – 40 cm	20
'Rosennymphe' , Bl pfirsichrosa, Ø 18 cm, Juni/ September, Wasserstand: 40 – 60 cm	22
'Sioux' , Bl orange, Ø 15 cm, Juni/September, Wasser- stand: 40 – 60 cm	22

(Ø = Durchmesser der Blüte)

Pflanzzeit: Mai - Juli



Teichpartie mit Wasser- und Sumpfpflanzen
Schattenstauden: Convallaria, Epimedium, Asperula etc.
Steingarten, Polsterstauden

Schling- und Kletterpflanzen

Clematis – Waldrebe – Ranunculaceae – ○ ●

Eine der wirkungsvollsten und reichblühendsten Schlingpflanzen, bei deren Anpflanzung darauf zu achten ist, daß die unteren Pflanzenteile durch entsprechende Vorpflanzungen beschattet werden. Sie gedeihen in lockeren, humuslosen Lehm Böden, wo für einen guten Wasserabzug gesorgt ist.

'Ernest Markham', Bl weinrot, Juli/September . T	10
'Jackmannii', Bl blauviolett, Juli/September . . T	10
montana 'Rubens', Bl zartrosa, kleinblumig, Mai/Juni T	10
'Nelly Moser', Bl rosa mit roten Streifen, Juli/Aug. T	10

Parthenocissus – Wilder Wein – Vitaceae – ○

Bekannter selbstklimmender Wein, der durch seine auffallend rote Herbstfärbung erfreut.

tricuspidata 'Veitchii', B efeuartig, Früchte blau-schwarz T	9
--	---

Polygonum – Schlingknöterich –

Polygonaceae – ○

Schnellwachsender, langblühender Schlinger mit weißen Blütenschleiern, die sich im Herbst rosa färben.

aubertii, Jahrestriebe bis zu 600 cm, Juli/Oktobre T	9
--	---

Rhododendron

Alpenrose - Ericaceae - ● ●

Laubabwerfende Arten:

japonicum, (Azalea mollis), 'Rote Töne', Bl orangerot, 120 – 150 cm, Mai, rote Herbstfärbung! ab 30 cm	ab 15
luteum (Azalea pontica) 'Ronsdorfer Auslese', Bl orangegelb, duftend, 150 – 200 cm, Mai, rote Herbstfärbung! ab 30 cm	ab 15

Halbwintergrüne Arten:

(Japanische Azaleen):

Rhododendron Arendsii-Hybriden, (G. A.):

Besonders reichblühende, winterharte Abkömmlinge japanischer Wildarten, die hier durch jahrelange Zuchtarbeit entstanden sind. Immer wieder werden unsere Rhododendron Arendsii-Hybriden zur Auflockerung, insbesondere zur Vorpflanzung von Rhododendron-Gruppen verwendet. Sie gedeihen an absonnigen bis halbschattigen Plätzen, wo genügend Bodenfeuchtigkeit vorhanden ist. Der Boden sollte nach Möglichkeit mit Torf und anderen Humusstoffen angereichert werden, auf jeden Fall aber müssen die Pflanzstellen kalkfrei sein. Volldüngergaben (30 – 40 g pro Quadratmeter) sollten erst bei gut angewurzelten Pflanzen gegeben werden, und zwar nach der Blütezeit bei Beginn des Austriebes, wobei dann darauf zu achten ist, daß der Boden vor und nach der Düngung genügend Feuchtigkeit enthält. Sollten Reste von Dünggaben auf dem Laubwerk verbleiben, so müssen diese entfernt werden.

- 'Agger', B halbwintergrün, hellgrün, Bl zartlila, 100 – 120 cm, Mai
- 'Bever', B halbwintergrün, hellgrün, Bl lila, großblumig, 80 – 100 cm, Mai/Juni
- 'Diemel', B halbwintergrün, gelbliche Herbstfärbung, Bl hellachs, 80–100 cm, Mai
- 'Eder', B halbwintergrün, gelborange Herbstfärbung, Bl lachsrosa, 60 – 80 cm, Mai/Juni
- 'Ennepe', B halbwintergrün, Bl kräftigrosa, 60 – 80 cm Mai/Juni
- 'Glör', B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, Bl dunkellachsrosa, 60 – 80 cm, Mai/Juni
- 'Kerspe', B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, Bl lachsrot, 60 – 80 cm Mai
- 'Lingese', B halbwintergrün, Bl orangerot, 50 – 60 cm, Mai/Juni
- 'Lister', B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, Bl rot, 60 – 80 cm, Mai



Rhododendron arendsii / Zweig (G. A.)

Rhododendron (aronense) ® 'Geisha' (G. A.), Zwergazalee

Rhododendron (aronense) ® 'Geisha' (G. A.), Zwergazalee

Japanische Azaleen – Fortsetzung

- 'Oester', B halbwintergr., Bl karminrosa, groß, blumig, 60 – 80 cm, Mai
- 'Sorpe', Wuchs gedungen, Bl mittelgroß violett, 50 – 60 cm, Mai/Juni
- 'Ülfe', B halbwintergrün, Bl purpur, 60 – 80 cm, Mai/Juni
- 'Volme', Bl lilarosa, großblumig, spät, 80 – 100 cm, Juni

japonicum 'Georg Arends' NEUHEIT 1971!

B fest und wintergrün, Bl großblumig karminrot, 80–100 cm, Mai/Juni

Verkaufsgrößen: 20/25 cm	12
25/30 cm	15
30/40 cm	18
Solitär.	ab 22

Rhododendron (Aronense)[®] - Geisha-Hybriden, (G. A.):

GRUPPE: in memoriam WERNER ARENDS 1896 – 1967
Namenschutz, Nachbau verboten!

Eine ebenfalls hier entstandene Zuchtform, die sich von unseren Rhododendron Arendsii-Hybriden nur durch ihren zwergigen Wuchs unterscheidet. Diese Art gedeiht unter denselben Wachstumsbedingungen wie Rhododendron Arendsii-Hybriden und läßt sich durch den zwergigen Wuchs noch im Steingarten und kleineren Gartenräumen verwenden, ältere Pflanzen haben eine Breite von 70 – 100 cm.

- Fumiko 'Geisha' purpurrosa, B halbwintergrün, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- Hanako 'Geisha' lilarosa, B halbwintergrün, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- Haruko 'Geisha' dunkellila, B halbwintergrün, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- Hiroko 'Geisha' purpurrosa, B halbwintergrün, weirote Herbstfärbung, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- Hisako 'Geisha', weiß, Neuheit 1971, Bl halbwintergrün, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- Kazuko 'Geisha' karminrot, B halbwintergrün, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- Kumiko 'Geisha' lachskarmin, B halbwintergrün, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- Michiko 'Geisha', dunkellachsrot, dunkleres Auge, Bl halbwintergrün, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- Momoko 'Geisha' rosa, B halbwintergrün, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- Noriko 'Geisha' karmin, halbgefüllt, B halbwintergrün, bronzerote Herbstfärbung, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- Satschiko 'Geisha' orangerot, Neuheit 1971, Bl halbwintergrün, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- Takako 'Geisha' lilarosa, B halbwintergrün, 20 – 30 cm, Mai/Juni

'Multiflorum', (G. A.), B halbwintergrün, Bl dunkelrosa, 20 – 30 cm, Mai

Verkaufsgrößen: 15/20	12
20/25	15
25/30	17
Solitär.	ab 22

Immergrüne, großblättrige und großblumige Rhododendron.

Allgemein bekannte Gartenformen zur Verwendung in halbschattigen Lagen, wo sie in kalkfreien, humosen und nicht zu trockenen Böden gut gedeihen.

Angegebene Höhen = Endhöhen

Verkaufsgrößen auf Anfrage

catawbiense 'Grandiflorum', Bl purpurviolett, 200 – 300 cm, Mai/Juni


'Cunningham's White', Bl weiß, 200 – 300 cm, Mai

'Dietrich', Bl leuchtendrosa, 150 – 200 cm, Mai/Juni

Edward S. Rand, Bl rubinrot, 150 – 200 cm, Mai/Juni

ab 40 cm

ab 21



Rhododendron catawbiense grdf.

Rhododendron Hybride

Rhododendron impeditum (G. A.)

	Preisgruppe
Rhododendron – Fortsetzung	
Lees Dark Purple , Bl dunkelpurpurviolett, 150–200 cm, Mai/Juni	ab 21
repens 'Scarlet Wonder' , Bl leuchtendrot, 40–60 cm, breitwachsend, April/Mai	ab 16
william-sianum 'Oudijk's Sensation' , Bl korallen- rosa, 60–80 cm, April/Mai	ab 19
Weitere Größen auf Anfrage.	

Kleinblättrige Wildformen und Zwergrhododendron:

Vielgestaltige Gehölze, die insbesondere in Stein- und
Heidegärten Verwendung finden können, zumal diese
Trockenheit vertragen.

Angegebene Höhen = Endhöhen
Verkaufsgrößen auf Anfrage

ferrugenum , echte Alpenrose, B dunkelgrün, unter- seits berostet, wintergrün, Bl purpurrosa, 60–80 cm ab 15–20 cm	ab 17
hirsutum , Almenrausch, B wintergrün, Bl rosa, 60– 80 cm, Mai/Juni	ab 17
impeditum , 'Amethyst', (G. A.), B graugrün, wintergrün, Bl lilablau, 40–50 cm, Mai	14
– 'Moerheim', B graugrün, wintergrün, Bl violettblau, 30–40 cm, Mai	ab 18
myrtifolium hort. , B wintergrün, Bl hellrosa, 60–80 cm, kugelige Büsche, Mai/Juni	15
praecox , Vorfrühlings-Alpenrose, B glänzend dunkel- grün, halbwintergrün, Bl lilarosa, 120–150 cm, März/April	ab 17
alpine , schwachwachsende Arten:	
keleticum , B dunkelgrün, wintergrün, Bl purpur, 10 cm, teppichbildend, Mai	ab 13
radicans , B graugrün, wintergrün, Bl purpur, 10 cm, teppichbildend, Mai	ab 13
radistrotum , (G. A.), B graugrün, wintergrün, Bl purpur, 15–20 cm, Mai	ab 14

Winterharte Heidekräuter Moorbeetpflanzen Kleingehölze



Die verschiedenen Heidekräuter sollten in unseren Gärten
mit den Pflanzengemeinschaften angesiedelt werden, wie es
ihrem natürlichen Vorkommen entspricht, d. h. mit Gräsern,
Ginstern, Wacholdern, Polsterpflanzen wie Antennaria,
Campanula, Thymian, Veronica u. a. Die Pflanzstellen sollten
reichlich mit Torf vorbereitet werden.

Ährenheide:

Bruckenthalia spiculifolia , B hellgrün, feinlaubig, Bl rosa, 15–20 cm, Juni	4
Erica vagans 'F. D. Maxwell' , Bl lachsrot, 20–30 cm, August/Oktob.	4
– 'Lyonesse', Bl weiß, 20–30 cm, August/Oktob.	4
– 'St. Keverne', Bl lachsrosa, 20–30 cm, Aug./Okt.	4

Besenheide:

Calluna vulgaris 'Alba Plena' , B dunkelgrün, Bl weiß gefüllt, 15–20 cm, dichte Polster, August/Sept.	3
– 'Alportii Praecox', (G. A.) B rötlichgrün, Bl rot 20–30 cm, Juli/August	3
– 'Cuprea', B gelb, kupfrige Herbstfärbung, Bl rosa, 10–15 cm, August/September	3
– 'Hibernica', B dunkelgrün, Bl rosa, kompakt wach- send, sehr lange Blütezeit, 15–20 cm, August/ Oktob.	3
– 'H. E. Beale', B graugrün, Bl rosarot, dichtgefüllt, 20–30 cm, August/September	3
– 'J. H. Hamilton', flach, kräftig rosa, gute Wuchs- form 15 cm, August/September	3
– 'Mullion', B dunkelgrün, Bl dunkelrosa, 10–15 cm, flache Polster, August/September	3



Calluna vulgaris, Besenheide

Erica carnea, Winterheide

Phyllodoce empetrifomis, Moosheide

Glockenheide:

Erica tetralix , B grau, Bl rosa, 15 – 20 cm, Juni/September	3
– ‘Alba’, B grau, Bl weiß, 15 – 20 cm, Juni/September	3
– x hybr. Dawn , B grün, Bl rosa, 15 – 20 cm, August	3
– x williamsii , B gelbgrün, Bl rosa, 15 – 20 cm, August/September	5
Phyllodoce empetriformis , Moosheide, Bl rosa, 15 – 20 cm, Mai	3

Schneeheide:

Erica carnea ‘Rubra’, B rötlich, Bl intensiv rot, flache Polster, 10 – 15 cm, Dezember/März	3
– ‘Springwood’, B hellgrün, Bl weiß, 10 – 15 cm, flachwachsend, März/April	3
– vivellii , Bl dunkelrot, B braungrün, 10 – 20 cm, März/April	3
– ‘Winter Beauty’, Bl rosa, 10 – 20 cm, Febr./März	3

Cotoneaster – Zwergmispel – Rosaceae ○ ◐

Sehr guter Bodendecker für kleinere Flächen

N.: Rhododendron, Gaultheria, Erica

dammeri radicans , B dunkelgrün, Bl weiß, Fr. scharlachrote Beeren. Pflanzentriebe flach kriechend, 15 – 20 cm T	ab 4
--	------

Cytisus – Geißklee, Ginster – Leguminosae – ○

x kewensis , Zwergelfenbeinginster, Bl rahmgelb, großblumig, Mai, 30 – 50 cm, zierlich überhängende Zweige 30 cm T	9
x praecox , Elfenbeinginster, Bl rahmgelb, Mai, 150 – 200 cm ab 30 – 40 cm T	ab 8
– ‘Goldspeer’, (G. A.), NEUHEIT, Bl goldgelb, Mai, 120 – 150 cm 30 – 40 cm T	9

Genista – Ginster – Leguminosae – ○

sagittalis , Pfeilginster, Bl goldgelb, Juni/Juli, 10 – 15 cm, niederliegende Zweige T	8
tinctoria ‘Compacta’, Färberginster, Bl gelb, Juli/ August, 50 – 60 cm T	8

Hedera – Efeu – Araliaceae – ○ ◐

helix , B 3 – 5 lappig, mit heller Zeichnung. Anfangs aufrechte, später dem Boden aufliegende Triebe, die sich bewurzeln. Immergrüner Bodendecker, 25 – 30 cm T	ab 4
---	------

Hydrangea – Hortensie –**Saxifragaceae** – ○ ◐ ◑

x acuminata ‘Preciosa’, (G. A.) 1964 Wertzeugnis 1 Klasse der Royal Horticultural Society. B broncefarbig, Bl hellerblühend, verfärbend in kupfrig- weinrot, Juli/September, 100 – 120 cm	ab 6
--	------

Penstemon – Bartfaden – Scrophulariaceae ○

Kleiner Halbstrauch mit purpurvioletten Blüten, der auf sonnigen Trockenmauern und in Heidegärten besonders zur Geltung kommt.

N.: Dryas, Inula ensifolia, Thymus, Veronica.

x scouleri , Bl purpurviolett, B graugrün/wintergrün, 25 cm, Mai/Juni T	4
---	---

Cassiope – Cypressenheide – Ericaceae – ○


Seltene Heidepflanze mit interessanter Belaubung und weißen Blütenglöckchen.

tetragona , B schuppenförmig, Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai	5
--	---

Gaultheria – Scheinbeere – Ericaceae – ○ ◐

Kriechende Kleingehölze zur Bodenbedeckung unter Rhododendron oder in Verbindung mit Heidekräutern.

procumbens , B braunrot, Herbstfärbung rot, Bl weiß, Früchte rote Beeren, 10 cm, Mai/Juni T	ab 4
---	------



Cytisus kewensis, Zwerg-Elfenbeinginster

Cytisus praecox, Elfenbeinginster

Genista sagittalis, Pfeilginster

EMPFEHLENSWERTE STAUDEN ZUR BESONDEREN VERWENDUNG:

w = wintergrün

Bodendeckende Stauden für Sonnenlagen:

Acaena
Antennaria
Arabis procurrens
Cerastium
Cotula
Iberis semp.
Lamium
Lotus corn.
Lysimachia nummularia
Sagina
Thymus
Veronica prostrata
Sedum
– hybridum w
– kamtschaticum
– Weihenstephaner Gold w

Gräser:

Festuca w

für Halbschatten - Schatten:

Ajuga
Asperula
Astilbe chin. Pumila
Asarum w
Campanula poscharskyana
Convallaria
Cotula
Hypericum calycinum w
Lamium
Omphalodes
Pachysandra w
Saxifraga umbrosa w
– spathulata w
Tiarella
Vinca w
Waldsteinia w
Wulfenia

Gräser:

Luzula w

Stauden für Mauer- und Treppenfugen

Campanula pusilla
Dianthus delt.
Erinus
Haberlea w
Herniaria
Linaria
Moehringia
Ramonda w
Sempervivum w
Veronica prostrata

Solitär-Blütenstauden für Einzelaufstellung:

Aruncus
Centaurea macr.
Delphinium
Dictamnus

Helianthus salicif.
Heracleum
Inula afghan.
Kniphofia
Ligularia
Macleaya
Peltiphyllum
Veratrum
Verbascum
Yucca

Gräser:

Cortaderia
Miscanthus
Sinarundinaria

haltbare Stauden - Schnittblumen

Achillea
Aquilegia
Aruncus
Aster amellus
– tongolensis
Astrantia
Campanula persicifolia
Chrysanthemum, alle
Coreopsis
Digitalis
Doronicum
Erigeron
Echinops
Gaillardia
Geum
Gypsophila
Helenium
Helianthus spars.
Heliopsis
Iris
Kniphofia
Liatris
Lupinus
Paeonia
Polemonium
Rudbeckia
Scabiosa
Solidago
Trollius

Blütenstauden für den Heidegarten

höhere:

Achillea mill.
Bupthalmum
Coreopsis
Geum
Lavandula
Liatris
Lychnis viscaria
Nepeta
Physostegia
Platycodon
Polemonium
Pulmonaria
Salvia
Sedum
Veronica incana

Gräser :

Avena
 Briza
 Calamagrostis
 Carex
 Elymus
 Festuca
 Koeleria
 Panicum
 Pennisetum
 Stipa
 und selbstverständlich:

Erica**Calluna**

Rhododendron aronensis

**niedrige Blütenstauden
für den Heidegarten :**

Acaena
 Achillea
 Anaphalis
 Antennaria
 Armeria
 Artemisia
 Campanula
 Carlina
 Dianthus
 Gypsophila
 Helianthemum
 Herniaria
 Hypericum poly.
 Iberis w
 Linum
 Polygonum
 Santolina
 Thymus
 Tunica
 Veronica

**Stauden für
Grabbeepflanzung :****sonnige Lagen :**

Acaena
 Cotula
 Dryas sünderm.
 Iberis w
 Sagina
 Sedum w
 Thymus
 Veronica prostr.

Gräser :

Festuca w
 Koeleria w

Erica w**Rhododendron**

– multiflorum w
 – aronensis w

**Grabbeepflanzung für
halbschattige - schattige
Lage :**

Astilbe chin. Pumila
 Campanula poscharsk.
 Saxifraga umbrosa w
 – spathulata w
 Vinca w
 Waldsteinia geoides w

Gaultheria w**Rhododendron**

– multiflorum w
 – aronensis w

**Uferstauden an fest um-
randeten Teichen :**

(auf normalem Garten-
boden)

Bergenia
 Brunnera
 Chelone
 Kniphofia
 Hemerocallis
 Iris sibirica
 Liatris
 Physostegia
 Tradescantia

Gräser :

Elymus
 Calamagrostis
 Miscanthus
 Spartina
 Sinarundinaria

**Uferstauden für
feuchten Standort :**


Astilbe
 Astrantia
 Eupatorium
 Filipendula
 Gillenia
 Iris kaempferi
 – pseudacorus
 Ligularia
 Lythrum
 Mimulus
 Myosotis
 Primula, Etagen- und
 Glockenprimula
 Primula rosea
 Peltiphyllum
 Ranunculus
 Thalictrum
 Trollius

Gräser :

Carex
 Glyceria

Farne :

Onoclea
 Osmunda
 Phyllitis



Veratrum nigrum, Schwarzer Germer

Empfehlenswerte Bücher

über Stauden und Alpine, die vor allem auch dem Liebhaber viel Anregung und Anleitung geben:

Die Freiland-Schmuckstauden

Ein umfassendes Staudenbuch in 2 Bänden,
bearbeitet von W. Schacht, L. Jelitto,
C. R. Jelitto, Fritz Nobis, Prof. R. Hansen und
H. Hagemann. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart

Band 1
und Band 2

Unser Garten - seine bunte Staudenwelt

von Prof. R. Hansen und Fr. Stahl, Obst- und
Gartenbau-Verlag, München, Ganzleinen

Der Steingarten

von Wilh. Schacht,
Ganzleinen, Eugen Ulmer-Verlag, Stuttgart

Informieren Sie sich bei Ihrem Buchhändler!

Verzeichnis der Gattungsnamen

Acaena	Seite 40	Convallaria	Seite 16
Acantholimon	40	Coreopsis	16
Achillea	6, 42	Cortaderia	66
Aconitum	6	Corydalis	46
Acorus	72	Cotoneaster	82
Actaea	6	Cotula	48
Aethionema	42	Cyclamen	48
Ajuga	42	Cytisus	82
Alchemilla	6		
Alisma	72	Delphinium	16
Althaea	6	Deschampsia	66
Alyssum	42	Dianthus	48
Anacyclus	42	Dicentra	18, 48
Anaphalis	42	Dictamnus	18
Androsace	42	Digitalis	18
Anemone	6, 42	Doronicum	18
Antennaria	42	Draba	48
Anthemis	44	Dryas	48
Aquilegia	8, 44	Dryopteris	70
Arabis	44		
Armeria	44	Echinops	18
Arrhenatherum	66	Edraianthus	48
Artemisia	44	Elymus	66
Aruncus	8	Epimedium	48
Asarum	44	Erica	80, 82
Asperula	44	Erigeron	18
Asplenium	68	Erinus	50
Aster	8, 44	Eriogonum	50
Astilbe	10, 44	Eryngium	18
Astrantia	10	Eupatorium	20
Athyrium	70	Euphorbia	20, 50
Aubrieta	46		
Avena	66	Festuca	66
Azalea = Rhododendron	76, 78	Filipendula	20
Bergenia	12	Gaillardia	20
Blechnum	70	Gaultheria	82
Briza	66	Genista	82
Bruckenthalia	80	Gentiana	20, 50
Brunnera	12	Geranium	20, 50
Bupththalmum	12	Geum	20
Butomus	72	Gillenia	20
		Globularia	50
Calamagrostis	66	Glyceria	72
Calla	72	Gypsophila	22, 50
Calluna	80		
Caltha	12, 72	Haberlea	50
Campanula	12, 46	Hacquetia	50
Carex	66	Hedera	82
Carlina	46	Helenium	22
Cassiope	82	Helianthemum	52
Centaurea	12	Helianthus	22
Cerastium	46	Helichrysum	52
Chelone	12	Heliopsis	22
Chiastophyllum	46	Heliosperma	52
Chrysanthemum	14, 16	Helleborus	22
Cimicifuga	16	Hemerocallis	22
Clematis	76		

Hepatica	Seite 52	Phlox	Seite 30, 32, 58
Heracleum	24	Phyllitis	70
Herniaria	52	Phyllodoce	82
Heuchera	24	Physalis	32
Hieracium	52	Physostegia	32
Hippuris	72	Phyteuma	58
Hosta	24	Plantago	58
Hydrangea	82	Platycodon	32
Hypericum	52	Podophyllum	32
Iberis	52, 54	Polemonium	34
Inula	24, 54	Polygonatum	34
Iris	24, 26, 54, 72	Polygonum	58, 76
Kentranthus	26	Polypodium	70
Kirengeshoma	26	Polystichum	70
Kniphofia	26	Pontederia	72
Koeleria	66	Potentilla	34, 58
Lamium	54	Primula	34, 36
Lathyrus	26	Prunella	58
Lavandula	54	Pulmonaria	36
Leontopodium	54	Pyrethrum =	
Lewisia	54	Chrysanthem. cocc.	14
Liatris	26	Ramonda	58
Ligularia	26, 28	Ranunculus	36, 74
Linaria	54	Rodgersia	36
Linum	54	Rhododendron	76, 78, 80
Lotus	54	Rudbeckia	36
Lupinus	28	Sagina	58
Luzula	66	Sagittaria	74
Lychnis	28	Salvia	36
Lysichiton	72	Santolina	58
Lysimachia	28, 54	Saponaria	60
Lythrum	28	Satureja	60
Macleaya	28	Saxifraga	60
Matteuccia	70	Scabiosa	38
Menyanthes	72	Scirpus	74
Mertensia	56	Sedum	38, 60, 62
Mimulus	72	Sempervivum	62
Miscanthus	68	Senecio = Ligularia	26, 28
Moehringia	56	Silene	62
Molina	68	Soldanella	62
Monarda	28	Solidago	38
Morina	28	Sinarundinaria	68
Myosotis	28, 72	Spartina	68
Nepeta	56	Stachys	38
Nuphar	72	Stipa	68
Nymphaea	74	Tellima	38
Nymphoides	72	Thalictrum	38
Oenothera	30, 56	Thymus	62, 64
Omphalodes	56	Tiarella	64
Onoclea	70	Tradescantia	38
Orontium	72	Trillium	38
Osmunda	70	Trollius	40
Pachysandra	56	Tunica	64
Paeonia	30	Typha	74
Panicum	68	Veratrum	40
Papaver	30, 56	Verbascum	40
Parthenocissus	76	Veronica	40, 64
Patrinia	56	Vinca	64
Peltiphyllum	30	Viola	64
Pennisetum	68	Viscaria = Lychnis	28
Penstemon	56, 82	Waldsteinia	64
		Wulfenia	64
		Yucca	40
		Zizanyopsis	74

Deutsche Pflanzennamen

Bezeichnungen, die den botanischen Namen entsprechen, (z. B. Aster, Azalee, Chrysantheme, Rhododendron usw.) sind hier nicht aufgeführt.

Akelei	.Aquilegia	Froschlöffel	.Alisma
Alant	.Inula	Fußblatt	.Podophyllum
Alpenglöckchen . .	.Soldanella		
Alpenveilchen . . .	.Cyclamen	Gamander	.Teucrium
		Gauklerblume	.Mimulus
		Gedenkemein	.Omphalodes
Bambus	.Sinarundinaria	Geißbart	.Aruncus
Berberitze	.Berberis	Gelbweiderich	.Lysimachia
Bergkamilie	.Anthemis	Gemswurz	.Doronicum
Bergminze	.Satureja	Germer	.Veratrum
Bienensaug	.Melittis	Ginster	.Cytisus
Bitterwurz	.Lewisia		und Genista
Blasenfarn	.Cystopteris	Glatthafer	.Arrhenatherum
Blattspiere	.Rodgersia	Glockenblume	.Campanula
Blauglöckchen . . .	.Mertensia	Goldbaldrian	.Patrinia
Blaukissen	.Aubrieta	Goldband-	
Blaustrahlhafer . .	.Avena	leistengras	.Spartina
Blaustrandhafer . .	.Elymus	Goldflammen-	
Blumenbinse	.Butomus	bandgras	.Phalaris
Blutweiderich . . .	.Lythrum	Goldkolben	.Orontium
Breitglocke	.Platycodon	Goldmargerite	.Bupththalmum
Brennende Liebe . .	.Lychnis	Goldrute	.Solidago
Brennender Busch . .	.Dictamnus	Grasnelke	.Armeria
Bruchkraut	.Herniaria	Günsel	.Ajuga
Brunnelle	.Prunella	Gundelrebe	.Glechoma
Chinaschilf	.Miscanthus	Habichtskraut	.Hieracium
Christrose	.Helleborus	Hahnenfuß	.Ranunculus
Christophskraut . .	.Actaea	Haselwurz	.Asarum
Cypressenheide . .	.Cassiope	Hainsimse	.Luzula
		Hechtkraut	.Pontederia
		Heide	.Erica u. Calluna
Dachwurz	.Sempervivum	Heiligenblume	.Sarntolina
Drachenkopf	.Physostegia	Herkuleskraut	.Heracleum
Dreiblatt	.Trillium	Herzljilie	.Hosta
Dreimasterblume . .	.Tradescantia	Himmelsleiter	.Polemonium
		Hirschzunge	.Phyllitis
		Hirse	.Panicum
Edeldistel	.Eryngium	Hornklee	.Lotus
Edelraute	.Artemisia	Hornkraut	.Cerastium
Edelweiß	.Leontopodium	Hornveilchen	.Viola
Efeu	.Hedera	Hortensie	.Hydrangea
Ehrenpreis	.Veronica	Hungerblümchen . . .	.Draba
Eisenhut	.Aconitum		
Elfenblume	.Edimedium	Igelkolben	.Sparganium
Enzian	.Gentiana	Igelpolster	.Acantholimon
		Immergrün	.Vinca
		Indianernessel	.Monarda
Fackellilie	.Kniphofia	Jacobsleiter	.Polemonium
Federborstengras . .	.Pennisetum	Johanniskraut	.Hypericum
Federmohn	.Macleaya	Jungfernrebe	.Parthenocissus
Feinstrahl	.Erigeron		
Felsenginster	.Genista	Kalmus	.Acorus
Felsenmispel	.Cotoneaster	Kardendistel	.Morina
Felsenteller	.Ramonda	Katzenminze	.Nepeta
Felsnelke	.Tunica	Katzenpfötchen	.Antennaria
Fetthenne	.Sedum	Kaukasus-	
Feuerdorn	.Pyracantha	vergißmeinnicht . . .	.Brunnera
Fieberklee	.Menyanthes	Knöterich	.Polygonum
Fiederpolster	.Cotula	Königsfarn	.Osmunda
Fingerhut	.Digitalis	Königskerze	.Verbascum
Fingerkraut	.Potentilla	Kokardenblume	.Gaillardia
Flammenblume	.Phlox	Kornblume	.Centaurea
Flockenblume	.Centaurea	Kreuzkraut	.Ligularia
Frauenfarn	.Athyrium		
Frauenmantel	.Alchemilla		

Kugelblume . . .	Globularia	Sonnenauge . . .	Heliopsis
Kugeldistel . . .	Echinops	Sonnenblume . . .	Helianthus
Kuhsschelle . . .	Anemone	Sonnenbraut . . .	Helenium
Lampionpflanze . . .	Physalis	Sonnenhut . . .	Rudbeckia
Lavendel . . .	Lavandula	Sonnenröschen . . .	Helianthemum
Leberbalsam . . .	Erinus	Spiere . . .	Astilbe und Filipendula
Leberblümchen . . .	Hepatica	Spornblume . . .	Centranthus
Leimkraut . . .	Silene	Süßgras . . .	Glyceria
Lein . . .	Linum	Sumpfd-Calla . . .	Calla
Leinkraut . . .	Linaria	Sumpfdotterblume . . .	Caltha
Lerchensporn . . .	Corydalis	Sumpfrosee . . .	Nyphoides
Lungenkraut . . .	Pulmonaria		
Mädchenauge . . .	Coreopsis	Schafgarbe . . .	Achillea
Maiblume . . .	Convallaria	Schaftholde . . .	Hacquetia
Maiapfel . . .	Podophyllum	Schaumblüte . . .	Tiarella
Mannschild . . .	Androsace	Scheinbeere . . .	Gaultheria
Margerite . . .	Chrysanthemum	Scheincalla . . .	Lysichiton
Mauerpfeffer . . .	Sedum	Schildblatt . . .	Peltiphyllum
Meerkohl . . .	Crambe	Schildblume . . .	Chelone
Mohn . . .	Papaver	Schildfarn . . .	Dryopteris
Moltkie . . .	Moltkia	Schillergras . . .	Koeleria
Moormyrte . . .	Pernetia	Schirmblatt . . .	Diphylleia
Moosmiere . . .	Moehringia	Schleierkraut . . .	Gypsophila
Mummel . . .	Nuphar	Schleifenblume . . .	Iberis
		Schlingknöterich . . .	Polygonum
Nachtkerze . . .	Oenothera	Schlüsselblume . . .	Primula
Nelke . . .	Dianthus	Schwertlilie . . .	Iris
Nelkenwurz . . .	Geum	Schwingelgras . . .	Festuca
Nieswurz . . .	Helleborus		
Palmlilie . . .	Yucca	Stachelnüsschen . . .	Acaena
Pampasgras . . .	Cortaderia	Steinbrech . . .	Saxifraga
Pechnelke . . .	Lychnis	Steinkraut . . .	Alyssum
Perlfarn . . .	Onoclea	Steintäschel . . .	Aethionema
Perlgras . . .	Melica	Sterndolde . . .	Astrantia
Pfeifengras . . .	Molina	Sternmoos . . .	Sagina
Pfeilkraut . . .	Sagittaria	Storachschnabel . . .	Geranium
Pfennigkraut . . .	Lysimachia	Stockrose . . .	Althaea
Pfingstrose . . .	Paeonia	Strahlensame . . .	Heliosperma
Pfriemengras . . .	Stipa	Straußenfarn . . .	Matteucia
Platterbse . . .	Lathyrus	Streifenfarn . . .	Asplenium
Prachtscharte . . .	Liatis	Strohblume . . .	Helichrysum
Prachtspiere . . .	Astilbe		
Punktfarn . . .	Polystichum	Taglilie . . .	Hemerocallis
Purpurglückchen . . .	Heuchera	Tannenwedel . . .	Hippuris
		Taubnessel . . .	Lamium
Reis, wilder . . .	Zizanyopsis	Teufelskralle . . .	Phyteuma
Riesengras . . .	Miscanthus	Thymian . . .	Thymus
Rippenfarn . . .	Blechnum	Tränendes Herz . . .	Dicentra
Rittersporn . . .	Delphinium	Trollblume . . .	Trollius
Rohrkolben . . .	Typha	Tüpfelfarn . . .	Polypodium
Salbei . . .	Salvia	Veilchen . . .	Viola
Salomonssiegel . . .	Polygonatum	Vergißmeinnicht . . .	Myosotis
Sandmiere . . .	Arenaria		
Sandrohr . . .	Calamagrostis	Wachsglocke . . .	Kirengeshoma
Scheinzypresse . . .	Chamaecyparis	Waldmeister . . .	Asperula
Seerose . . .	Nymphaea	Walldrebe . . .	Clematis
Segge . . .	Carex	Waldschmiele . . .	Deschampsia
Seifenkraut . . .	Saponaria	Wasserdost . . .	Eupatorium
Silberdistel . . .	Carlina	Wegerich . . .	Plantago
Silberimmortelle . . .	Anaphalis	Wiesenraute . . .	Thalictrum
Silberkerze . . .	Cimicifuga	Wilder Reis . . .	Zizanyopsis
Silberwegerich . . .	Plantago	Windröschen . . .	Anemone
Silberwurz . . .	Dryas	Wolfsmilch . . .	Euphorbia
Simse . . .	Scirpus	Wollblatt . . .	Eriophyllum
		Wollknöterich . . .	Eriogonum
		Ziest (Woll-) . . .	Stachys
		Zwergmargerite . . .	Anacyclus
		Zwergmispel . . .	Cotoneaster



(Verbascum long. Pannosum, Königskerze)

Besuchen Sie und informieren Sie sich :

Gartenbauausstellungen, Botanische Gärten und Parkanlagen

z. B. Berlin-Dahlem, Bonn, Köln, München - Nymphenburg,
Gruga - Park Essen, Westfalenpark Dortmund, Berggarten
Hannover-Herrenhausen, Palmengarten Frankfurt, Killesberg
Stuttgart, **Mannheim Bundesgartenschau 1975** und

Staudensichtungsgärten, bes. Staudensichtungsgarten
Weihenstephan / Freising bei München



NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Durch die Erteilung eines Auftrages gelten die Bedingungen zwischen uns und dem Käufer als rechtlich bindend.

Die Preise sind im Katalog als Preisgruppen bezeichnet, die Sie entschlüsselt aus der Preistabelle entnehmen können. Es sind **Stückpreise in DM** und verstehen sich zur Lieferung ab Gärtnerei incl. der z. Z. gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer von 8 %, ausschließlich Verpackung. **Mengenrabatt** geht aus der Preisstaffel hervor.

Es handelt sich um ein unverbindliches Angebot, das, falls es die Marktlage erfordert, während der Gültigkeitsdauer abgeändert werden kann. Die Preise früherer Kataloge verlieren mit Erscheinen dieser Preisliste ihre Gültigkeit.

Lieferung: Die Bestellungen werden in der Reihenfolge des Eingangsdatums bearbeitet. **Gewünschte Liefertermine werden berücksichtigt und eingehalten.** Falls höherer Gewalt (ungünstige Witterungsumstände, Betriebsstörungen u. a.) und unvorhergesehene Ereignisse entbinden uns von der Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist. **Gleichwertiger und ähnlicher Ersatz für fehlende Sorten und Arten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten ist.** Auftragsbestätigung erfolgt nur in Ausnahmefällen.

Versand und Verpackung: Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers, wobei die Vorschriften desselben stets beachtet werden. Liegen keine Versandvorschriften vor, so sind wir berechtigt, die vorteilhafteste und zweckmäßigste Versandart zu wählen, wobei wir jedoch keinerlei Verantwortung übernehmen. Sorgfältige und individuelle Verpackung der Pflanzen wird beim Versand zu Selbstkosten berechnet und kann nicht zurückgenommen werden. **Bei Abholung** von Pflanzen ist bei Auftragserteilung der Abholtermin anzugeben.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf. Gerichtsstand Wuppertal.

Zahlungsbedingungen: Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen worden sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden. Rechnungen sind am Tage ihrer Ausstellung fällig, zahlbar nach Erhalt der Ware, spätestens innerhalb 30 Tagen. Unberechtigte Abzüge werden nicht anerkannt. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen kann nicht gegeben werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungsbetrag geleistet.

Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens 5 Tage nach Empfang der Lieferung zu erfolgen. Dieselben werden dann sorgfältig geprüft und zuvorkommend erledigt. Transportschäden sind vom Empfänger sofort von Beamten der Bundesbahn bzw. Bundespost bestätigen zu lassen.

GEORG ARENDS

Inhaber: U. Maubach-Arends



Qualitätszeichen
Stauden

PREISGRUPPEN

in DM incl. 8% Mehrwertsteuer

Gruppe	Stückpreis bei Abnahme ab:		
	1 Stück	5 Stück	25 Stück
1	1,50	1,35	1,20
2	1,80	1,65	1,45
3	2,15	1,95	1,75
4	2,50	2,25	2,—
5	3,—	2,70	2,40
6	3,50	3,15	2,80
7	4,20	3,80	3,40
8	5,—	4,50	4,—
9	5,80	5,25	4,65
10	6,80	6,15	5,45
11	7,80	7,05	6,25
12	8,80	7,95	7,05
13	9,80	8,85	7,90
14	10,80	9,75	8,65
15	12,20	11,—	9,80
16	13,80	12,45	11,05
17	15,—	13,50	12,—
18	16,20	14,60	13,—
19	18,40	16,60	14,75
20	19,60	17,65	15,70
21	21,—	18,90	16,80
22	23,—	20,70	18,40

Stauden-Sortimente:

(Seite 5)

I + II	DM 120,—	VII - IX	DM 175,—
III + IV	DM 140,—	X - XII	DM 190,—
V + VI	DM 160,—		

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

